

પત્રક—અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
(સમય તા: ૦૧.૦૨.૧૨ થી ૦૫.૦૨.૧૨)

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાકિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	000.0
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	27.7
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	11.9
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	57-21
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	6.2

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૦૫.૦૨.૧૨ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૦૧.૦૨.૧૨	૦	૦
	૦૨.૦૨.૧૨	૦	૦
	૦૩.૦૨.૧૨	૦	૦
	૦૪.૦૨.૧૨	૦	૦
	૦૫.૦૨.૧૨	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૦૧.૦૨.૧૨	૨૭	૨૮
	૦૨.૦૨.૧૨	૨૮	૨૮
	૦૩.૦૨.૧૨	૨૯	૨૯
	૦૪.૦૨.૧૨	૩૦	૩૦
	૦૫.૦૨.૧૨	૨૯	૨૭
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૦૧.૦૨.૧૨	૧૬	૧૨
	૦૨.૦૨.૧૨	૧૬	૧૨
	૦૩.૦૨.૧૨	૧૭	૧૩
	૦૪.૦૨.૧૨	૧૮	૧૫
	૦૫.૦૨.૧૨	૧૭	૧૪
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૦૧.૦૨.૧૨	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૦૨.૦૨.૧૨	મોટેભાગે ચોખ્ખું	મોટેભાગે ચોખ્ખું
	૦૩.૦૨.૧૨	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૦૪.૦૨.૧૨	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૦૫.૦૨.૧૨	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
મહત્તમ ભેજ (%)	૦૧.૦૨.૧૨	૪૧	૪૬
	૦૨.૦૨.૧૨	૩૯	૪૪
	૦૩.૦૨.૧૨	૪૬	૪૬
	૦૪.૦૨.૧૨	૫૭	૬૧
	૦૫.૦૨.૧૨	૭૪	૭૭
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૦૧.૦૨.૧૨	૨૫	૨૭
	૦૨.૦૨.૧૨	૨૫	૨૬
	૦૩.૦૨.૧૨	૩૧	૩૧
	૦૪.૦૨.૧૨	૩૯	૩૯
	૦૫.૦૨.૧૨	૪૧	૪૩
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૦૧.૦૨.૧૨	૦૨૬	૦૨૬
	૦૨.૦૨.૧૨	૦૨૦	૦૧૯
	૦૩.૦૨.૧૨	૦૧૩	૦૧૩
	૦૪.૦૨.૧૨	૦૧૩	૦૧૫
	૦૫.૦૨.૧૨	૦૧૫	૦૧૩
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૦૧.૦૨.૧૨	૨૯	૩૪
	૦૨.૦૨.૧૨	૩૧	૩૬
	૦૩.૦૨.૧૨	૫૫	૬૦
	૦૪.૦૨.૧૨	૩૧૪	૩૧૦
	૦૫.૦૨.૧૨	૩૨૪	૩૨૩

પત્રક-ક
જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ

ખેત આબોહવાકિય વિસ્તાર	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
	ઘાણા	૧. ઘાણામા ચરમી રોગના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૨૫ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણી મા ભેળવી છંટકાવ કરવો.
	લસણ	૧. પાકમા સમયસર નિંદામણ કરવું. ૨. ગાંઠીયાના વિકાસ સમયે અવશ્ય પિયત આપવું. ૩. પાનના સુકારા રોગના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૨૫ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણી મા ભેળવી છંટકાવ કરવો.
	ઘઉં	૧. પાકમા ગેરૂનો ઉપદ્રવ જણાયતો મેન્કોઝેબ ૨૫ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણી મા ભેળવી છંટકાવ કરવો.
	ઉનાળુ પાકો	૧. પિયતની સગવડતા હોયતો ઉનાળુ મગફળી, મગ તથા બાજરીના વાવેતર માટે જમીન સારી રીતે ખેડી તૈયાર કરવી.
	લીંબુ	૧. બળીયા ટપકા રોગના નિયંત્રણ માટે કોપર ઓક્સી ક્લોરાઈડ ૩૦ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણી મા ભેળવી છંટકાવ કરવો.

JUNAGADH

Phone : 0285-2670139

Date :31-01-2012

(Period 1 to 5 February -2012)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	000.0
Maximum temperature ⁰ C	27.2-28.7
Minimum temperature ⁰ C	8.0-15.2
RH % (Morning/Afternoon)	57-21
Wind speed (Kmph)	5.6-7.2
Cloud cover	0

Weather forecast for Junagadh Dist. until 0830 hrs of 05-02-2012

Parameters	Day-1 01-02-2012	Day-2 02-02-12	Day-3 03-02-12	Day-4 04-02-12	Day-5 05-02-2012
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature ⁰ C	27	28	29	30	29
Minimum temperature ⁰ C	16	16	17	18	17
Cloud cover (Okta)	0	1	0	0	0
RH % (Morning/After noon)	41-25	39-25	46-31	57-39	74-41
Wind speed (Kmph)	026	020	018	013	015
Wind direction(Deg)	29	31	55	314	324

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Chickpea/Gram	Pod Development	1) For the control of <i>Heliothis</i> , Spray Endosulphan 35 EC 20 ml. or Monocrotophos 36 EC. 12 ml. or Quinalphos 25 Ec 20 ml. or D.D.V.P 85 EC 5 ml in 10 liter of water. 2) Apply irrigation as and when required.
Wheat	Spikelet formation	1) Apply irrigation to the crop at the critical stages. 2) For the control of rust disease in wheat, spray mencozeb 25 gm in 10 liters of water.
Castor	Maturity	1) Apply irrigation as and when required..
Garlic	-	1) Timely weeding operation should be carried out. 2) Apply irrigation at the time of bulb formation and development.
Summer crops	-	1) Land should be prepares for summer crops like Groundnut, Moong and Pearl millet.

PORBANDAR

Phone : 0285-2670139

Date : 31-01-2012

(Period 1 to 5 February -2012)

Weather forecast for **Porbandar** Dist. until 0830 hrs of 05-02-2012

Parameters	Day-1 01-02-2012	Day-2 02-02-12	Day-3 03-02-12	Day-4 04-02-12	Day-5 05-02-2012
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature ⁰ C	28	28	29	30	27
Minimum temperature ⁰ C	12	12	13	15	14
Cloud cover (Okta)	0	1	0	0	0
RH % (Morning/After noon)	46-27	44-26	46-31	61-39	77-43
Wind speed (Kmph)	026	019	013	015	013
Wind direction(Deg)	34	36	60	310	323

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Chickpea/Gram	Pod Development	1) For the control of heliothis ,Spray Endosulphan 35 EC 20 ml. or Monocrotophos 36 EC. 12 ml. or Quinalphos 25 Ec 20 ml. or D.D.V.P 85 EC 5 ml in 10 liter of water. 2) Apply irrigation as and when required.
Wheat	Spikelet formation	1) Apply irrigation to the crop at the critical stages. 2) For the control of rust disease in wheat, spray mencozeb 25 gm in 10 liters of water.
Castor	Maturity	2) Apply irrigation as and when required.
Garlic	-	1) Timely weeding operation should be carried out. 2) Apply irrigation at the time of bulb formation and development.
Summer crops	-	1) Land should be prepares for summer crops like Groundnut, Moong and Pearl millet.