

પત્રક—અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન

( સમય તા : ૦૬.૦૨.૧૩ થી ૧૦.૦૨.૧૩ )

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાકિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	૦૦૦.૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગે.)	૩૦.૧
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૭.૪
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	૭૮-૩૭
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૪.૬

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી ( તા.૧૦.૦૨.૧૩ સુધી )

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૦૬.૦૨.૧૩	૦	૦
	૦૭.૦૨.૧૩	૦	૦
	૦૮.૦૨.૧૩	૦	૦
	૦૯.૦૨.૧૩	૦	૦
	૧૦.૦૨.૧૩	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૦૬.૦૨.૧૩	૨૭	૨૭
	૦૭.૦૨.૧૩	૨૮	૨૭
	૦૮.૦૨.૧૩	૨૯	૨૮
	૦૯.૦૨.૧૩	૩૧	૩૧
	૧૦.૦૨.૧૩	૩૩	૩૨
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૦૬.૦૨.૧૩	૧૭	૧૫
	૦૭.૦૨.૧૩	૧૫	૧૪
	૦૮.૦૨.૧૩	૧૭	૧૫
	૦૯.૦૨.૧૩	૧૬	૧૬
	૧૦.૦૨.૧૩	૧૭	૧૬
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૦૬.૦૨.૧૩	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૦૭.૦૨.૧૩	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૦૮.૦૨.૧૩	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૦૯.૦૨.૧૩	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૧૦.૦૨.૧૩	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
મહત્તમ ભેજ (%)	૦૬.૦૨.૧૩	૫૩	૫૪
	૦૭.૦૨.૧૩	૨૫	૧૯
	૦૮.૦૨.૧૩	૩૬	૩૦
	૦૯.૦૨.૧૩	૩૪	૨૫
	૧૦.૦૨.૧૩	૪૩	૩૦
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૦૬.૦૨.૧૩	૩૫	૨૦
	૦૭.૦૨.૧૩	૨૨	૧૪
	૦૮.૦૨.૧૩	૨૮	૧૭
	૦૯.૦૨.૧૩	૩૧	૧૮
	૧૦.૦૨.૧૩	૩૫	૨૨
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૦૬.૦૨.૧૩	૦૧૯	૦૧૧
	૦૭.૦૨.૧૩	૦૨૦	૦૧૨
	૦૮.૦૨.૧૩	૦૨૨	૦૧૪
	૦૯.૦૨.૧૩	૦૨૨	૦૧૫
	૧૦.૦૨.૧૩	૦૧૮	૦૧૩
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૦૬.૦૨.૧૩	૩૩૩	૨૩૭
	૦૭.૦૨.૧૩	૪૨	૨૩
	૦૮.૦૨.૧૩	૧૬	૧૮
	૦૯.૦૨.૧૩	૨૩	૨૩
	૧૦.૦૨.૧૩	૧૯	૨૪

પત્રક-ક

જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ

ખેત આબોહવાકિય વિસ્તાર	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	ધાણા	- પાકમાં ભુકીછારા રોગના નિયંત્રણ માટે હેકઝાકોનેઝોલ અથવા પ્રોપીકોનેઝોલ ૧૦ મી.લી. ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો.
	ઘઉં	- ઘઉંના પાકને કટોકટી અવસ્થા જેવીકે દુધીયા દાણા ભરાવા અને પોક અવસ્થાએ અવશ્ય પીયત આપવું.
	લસણ/ડુંગળી	- પાકમાં પાનના ટપકા /પારજાંબલી ઘાબા રોગના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૩૦ ગ્રામ. ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો.
	ઉનાળુ મગફળી	- જો પિયતની પુરતી સગવડ હોય તો ઉનાળુ મગફળી ની જાતો જેવી કે જી.જી.-૨, જી.જી.-૪ અથવા ટીજી-૨૬ નુ બીયારણ વાવેતર માટે ખરીદ કરી તૈયાર રાખવું.
	કલમી બોર	- બોરના પુખ્ત ઝાડને ૧૫ દિવસે પિયત આપવું. - પરિપક્વ ફળો ઉતારી, ગ્રેડીંગ કરી બજારમા મુકવા.

# Junagadh

Phone: 0285-2670139

Date: 5-02-2013

(Period 06 February to 10 February -2013)

## Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	000.0
Maximum temperature <sup>0</sup> C	28.7-32.2
Minimum temperature <sup>0</sup> C	16.8-18.4
RH % (Morning/Afternoon)	78-37
Wind speed (Kmph)	3.1-5.9
Cloud cover	2-6

## Weather forecast for Junagadh Dist. until 0830 hrs of 10- 02-2013

Parameters	Day-1 06-01-13	Day-2 07-02-13	Day-3 08-02-13	Day-4 09-02-13	Day-5 10-02-13
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature <sup>0</sup> C	27	28	29	31	33
Minimum temperature <sup>0</sup> C	17	15	17	16	17
Cloud cover (Okta)	0	0	0	0	0
RH % (Morning/After noon)	53-35	25-22	36-28	34-31	43-35
Wind speed (Kmph)	019	020	022	022	018
Wind direction(Deg)	333	42	16	23	19

## Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Coriander	Seed formation	- For the control of powdery mildew disease, spray Hexaconazole or Propiconazole @ 10 ml/10 liters of water.
Wheat	Booting/Milking	- If there is limited source of irrigation water, apply irrigation to the crop at the critical stages like booting and milking stages.
Onion/Garlic	Bulb formation	- For the control of leaf spot disease, spray Mencozeb 30 gm in 10 liters of water.
Summer Groundnut	-	- If irrigation facility is available, collect the seed of early varieties like GG-2, GG-5 or TG- 26.
Grafted Ber	-	- Apply irrigation at an interval of 15 days - Harvest the fruits, grading it and then sent to the market.

## Porbandar

Phone : 0285-2670139

Date :-05-02-2013

(Period 06 February to 10 February -2013)

### Weather forecast for **Porbandar** Dist. until 0830 hrs of 10-02-2013

Parameters	Day-1 06-01-13	Day-2 07-02-13	Day-3 08-02-13	Day-4 09-02-13	Day-5 10-02-13
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature <sup>0</sup> C	27	27	28	31	32
Minimum temperature <sup>0</sup> C	15	14	15	16	16
Cloud cover (Okta)	0	0	0	0	0
RH % (Morning/After noon)	54-20	19-14	30-17	25-18	30-22
Wind speed (Kmph)	011	012	014	015	013
Wind direction(Deg)	237	23	18	23	24

### Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Coriander	Seed formation	- For the control of powdery mildew disease, spray Hexaconazole or Propiconazole @10 ml/10 liters of water.
Wheat	Booting/Milking	- If there is limited source of irrigation water, apply irrigation to the crop at the critical stages like booting and milking stages.
Onion/Garlic	Bulb formation	- For the control of leaf spot disease, spray Mencozeb 30 gm in 10 liters of water.
Summer Groundnut	-	- If irrigation facility is available, collect the seed of early varieties like GG-2, GG-5 or TG- 26.
Grafted Ber	-	- Apply irrigation at an interval of 15 days - Harvest the fruits, grading it and then sent to the market.