

પત્રક—અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન  
(સમય તા: ૧૪.૦૩.૧૨ થી ૧૮.૦૩.૧૨)

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાકિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	000.0
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	32.9
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	14.2
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	51-10
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	4.9

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૧૮.૦૩.૧૨ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૧૪.૦૩.૧૨	૦	૦
	૧૫.૦૩.૧૨	૦	૦
	૧૬.૦૩.૧૨	૦	૦
	૧૭.૦૩.૧૨	૦	૦
	૧૮.૦૩.૧૨	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૪.૦૩.૧૨	૩૨	૩૧
	૧૫.૦૩.૧૨	૩૪	૩૩
	૧૬.૦૩.૧૨	૩૫	૩૪
	૧૭.૦૩.૧૨	૩૬	૩૩
	૧૮.૦૩.૧૨	૩૫	૩૨
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૪.૦૩.૧૨	૨૧	૨૦
	૧૫.૦૩.૧૨	૨૪	૨૩
	૧૬.૦૩.૧૨	૨૫	૨૪
	૧૭.૦૩.૧૨	૨૪	૨૩
	૧૮.૦૩.૧૨	૨૪	૨૩
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૧૪.૦૩.૧૨	મોટેભાગે ચોખ્ખું	મોટેભાગે ચોખ્ખું
	૧૫.૦૩.૧૨	મોટેભાગે ચોખ્ખું	મોટેભાગે ચોખ્ખું
	૧૬.૦૩.૧૨	મોટેભાગે ચોખ્ખું	મોટેભાગે ચોખ્ખું
	૧૭.૦૩.૧૨	મોટેભાગે ચોખ્ખું	મોટેભાગે ચોખ્ખું
	૧૮.૦૩.૧૨	મોટેભાગે ચોખ્ખું	મોટેભાગે ચોખ્ખું
મહત્તમ ભેજ (%)	૧૪.૦૩.૧૨	૩૬	૪૦
	૧૫.૦૩.૧૨	૩૪	૩૮
	૧૬.૦૩.૧૨	૪૪	૫૦
	૧૭.૦૩.૧૨	૫૯	૬૯
	૧૮.૦૩.૧૨	૬૬	૭૪
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૧૪.૦૩.૧૨	૨૭	૩૧
	૧૫.૦૩.૧૨	૨૩	૨૫
	૧૬.૦૩.૧૨	૨૫	૨૮
	૧૭.૦૩.૧૨	૨૯	૩૪
	૧૮.૦૩.૧૨	૩૮	૪૨
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૪.૦૩.૧૨	૦૧૯	૦૧૯
	૧૫.૦૩.૧૨	૦૧૫	૦૧૫
	૧૬.૦૩.૧૨	૦૧૫	૦૧૫
	૧૭.૦૩.૧૨	૦૧૭	૦૧૭
	૧૮.૦૩.૧૨	૦૧૫	૦૧૫
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૧૪.૦૩.૧૨	૨૦	૩૦
	૧૫.૦૩.૧૨	૨૦	૪૦
	૧૬.૦૩.૧૨	૩૫૦	૩૪૦
	૧૭.૦૩.૧૨	૩૪૦	૩૩૦
	૧૮.૦૩.૧૨	૩૨૦	૩૧૦

**પત્રક-ક**  
**જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ**

ખેત આબોહવાકિય વિસ્તાર	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	ઉનાળુ મગફળી	૧. પાકમા સમયસર નિંદામણ કરવું. ૨. પાકમા પાન કથીરીના નિયંત્રણ માટે ડાયકોફોલ ૧૮ % ઈ.સી. ૨૭ મીલી. દવા ૧૦ લીટર પાણીમા ભેળવી છંટકાવ કરવો. ૩. પાકમા ગેરૂ તથા ટીકકા રોગના નિયંત્રણ માટે નીચે દર્શાવેલ કુગનાશક દવાઓ ૧૦ લીટર પાણીમા ઓગાળી ૩૫, ૫૫ અને ૭૦ દિવસે છંટકાવ કરવો. મેન્કોઝેબ ૭૫ % વે.પા. ૨૫ ગ્રામ (૩૫ દિવસે) કાર્બન્ડીઝમ ૫૦ % વે.પા. ૨૫ ગ્રામ (૫૫ દિવસે) મેન્કોઝેબ ૭૫ % વે.પા. ૨૫ ગ્રામ (૭૦ દિવસે)
	ઉનાળુ બાજરી	૧. ઉનાળુ બાજરીના પાકને પુર્તિ ખાતરનો પ્રથમ હપ્તો ૨૧ દિવસે ૨૫ કિગ્રા. નાઈટ્રોજન એટલેકે ૯ કિગ્રા. યુરીયા પ્રતિ વીઘા દીઠ આપવું.
	ઉનાળુ મગ	૧.ઉનાળુ મગનુ વાવેતર ૧૫ માર્ચ સુધીમા કરી લેવું. વાવતા પહેલા ૧ કિગ્રા. બીજ દીઠ ૩ ગ્રામ મન્કોઝેબનો પટ આપવો. પાકની વાવણી સમયે પાયાના ખાતર તરીકે હેકટરે ૮૭ કિગ્રા.ડી.એ.પી. અને ૧૦ કિગ્રા. યુરીયા આપવું.
	આંબા	૧.આંબાની કલમો બાંધવી અને નાની કલમોને જરૂરીયાત મુજબ પિયત આપવું.
	બોર, જામફળ અને સીતાફળ	૧.બોર, જામફળ અને સીતાફળના પુખ્ત વયના ઝાડના બગીચાને સંપુર્ણ આરામ આપવો.

## JUNAGADH

Phone : 0285-2670139

Date :13-03-2012

(Period 14 to 18 March -2012)

### Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	000.0
Maximum temperature °C	32.6-33.2
Minimum temperature °C	12.2-16.0
RH % (Morning/Afternoon)	51-10
Wind speed (Kmph)	4.1-5.8
Cloud cover	0

### Weather forecast for Junagadh Dist. until 0830 hrs of 18-03-2012

Parameters	Day-1 14-03-2012	Day-2 15-03-12	Day-3 16-03-12	Day-4 17-03-12	Day-5 18-03-2012
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	32	34	35	36	35
Minimum temperature °C	21	24	25	24	24
Cloud cover (Okta)	1	2	2	2	1
RH % (Morning/After noon)	36-27	34-23	44-25	59-29	66-38
Wind speed (Kmph)	019	015	015	017	015
Wind direction(Deg)	20	20	350	340	320

### Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Summer Moong	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Summer moong should be sown before 15th March.</li> <li>2) Before sowing the seed should be treated with Mancozeb @ 3 gm./1 kg. Seed.</li> <li>3) Apply 87 kg DAP and 10 kg Urea at the time of sowing.</li> </ol>
Castor	Maturity	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apply irrigation as and when required.</li> </ol>
Summer peanut	germination/vegetative	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Timely weeding should be carried out.</li> <li>2) For the control of tikka and rust diseases, spray, mencozeb 75% W.P. 25 gm (35DAS), carbandezim 50% W.P. 5 gm (55 DAS ) and mencozeb 75% W.P. 25 gm (70DAS) in 10 litres of water.</li> </ol>
Summer Pearl millet	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) The first dose of top dressing fertilizer should be applied in the form of urea @ 25 kg./ha after 21 DAS.</li> </ol>
Mango and Sapota	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apply irrigation to the crops at an interval of 8-10 days.</li> </ol>

## PORBANDAR

Phone : 0285-2670139

Date : 13-03-2012

(Period 14 to 18 March -2012)

**Weather forecast for Porbandar Dist. until 0830 hrs of 18-03-12**

Parameters	Day-1 14-03-2012	Day-2 15-03-12	Day-3 16-03-12	Day-4 17-03-12	Day-5 18-03-2012
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	31	33	34	33	32
Minimum temperature °C	20	23	24	23	23
Cloud cover (Okta)	1	2	2	2	1
RH % (Morning/After noon)	40-31	38-25	51-28	69-34	74-42
Wind speed (Kmph)	019	015	015	017	015
Wind direction(Deg)	30	40	340	330	310

### Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Summer Moong	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Summer moong should be sown before 15th March.</li> <li>2) Before sowing the seed should be treated with Mancozeb @ 3 gm./1 kg. Seed.</li> <li>3) Apply 87 kg DAP and 10 kg Urea at the time of sowing.</li> </ol>
Castor	Maturity	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apply irrigation as and when required.</li> </ol>
Summer peanut	germination/vegetative	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Timely weeding should be carried out.</li> <li>2) For the control of tikka and rust diseases, spray, mencozeb 75% W.P. 25 gm (35DAS), carbandezim 50% W.P. 5 gm (55 DAS ) and mencozeb 75% W.P. 25 gm (70DAS) in 10 litres of water.</li> </ol>
Summer Pearl millet	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) The first dose of top dressing fertilizer should be applied in the form of urea @ 25 kg./ha after 21 DAS.</li> </ol>
Mango and Sapota	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apply irrigation to the crops at an interval of 8-10 days.</li> </ol>