

પત્રક—અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
(સમય તા : ૧૬.૦૧.૧૩ થી ૨૦.૦૧.૧૩)

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાકિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	૦૦૦.૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૩૦.૭
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૩.૨
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	૬૯-૨૪
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૪.૫

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૨૦.૦૧.૧૩ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૧૨.૦૧.૧૩	૦	૦
	૧૩.૦૧.૧૩	૦	૦
	૧૪.૦૧.૧૩	૦	૦
	૧૫.૦૧.૧૩	૦	૦
	૧૬.૦૧.૧૩	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૨.૦૧.૧૩	૩૨	૩૧
	૧૩.૦૧.૧૩	૩૧	૨૯
	૧૪.૦૧.૧૩	૨૮	૨૭
	૧૫.૦૧.૧૩	૨૬	૨૬
	૧૬.૦૧.૧૩	૨૭	૨૭
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૨.૦૧.૧૩	૨૩	૧૫
	૧૩.૦૧.૧૩	૨૩	૧૫
	૧૪.૦૧.૧૩	૨૧	૧૪
	૧૫.૦૧.૧૩	૧૯	૧૪
	૧૬.૦૧.૧૩	૧૯	૧૪
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૧૨.૦૧.૧૩	વાદળછાયુ	વાદળછાયુ
	૧૩.૦૧.૧૩	મોટેભાગે વાદળછાયુ	મોટેભાગે વાદળછાયુ
	૧૪.૦૧.૧૩	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૧૫.૦૧.૧૩	મોટેભાગે ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૧૬.૦૧.૧૩	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
મહત્તમ ભેજ (%)	૧૨.૦૧.૧૩	૮૧	૯૨
	૧૩.૦૧.૧૩	૮૮	૯૪
	૧૪.૦૧.૧૩	૪૮	૫૧
	૧૫.૦૧.૧૩	૪૮	૫૭
	૧૬.૦૧.૧૩	૩૭	૨૭
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૧૨.૦૧.૧૩	૬૫	૫૬
	૧૩.૦૧.૧૩	૬૮	૬૯
	૧૪.૦૧.૧૩	૪૦	૩૭
	૧૫.૦૧.૧૩	૩૪	૨૬
	૧૬.૦૧.૧૩	૧૯	૧૨
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૨.૦૧.૧૩	૦૧૮	૦૧૨
	૧૩.૦૧.૧૩	૦૧૫	૦૧૦
	૧૪.૦૧.૧૩	૦૨૫	૦૧૫
	૧૫.૦૧.૧૩	૦૧૮	૦૧૨
	૧૬.૦૧.૧૩	૦૨૨	૦૧૩
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૧૨.૦૧.૧૩	૩૪૬	૩૫૬
	૧૩.૦૧.૧૩	૩૧૫	૩૩૪
	૧૪.૦૧.૧૩	૩૦૬	૩૧૩
	૧૫.૦૧.૧૩	૧૯	૨૧
	૧૬.૦૧.૧૩	૨૭	૨૭

પત્રક-ક

જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ

ખેત આબોહવાકિય વિસ્તાર	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	મકાઈ	- ચારા માટે વાવેલ મકાઈની સમયસર કાપણી કરવી.
	દિવેલા	- દિવેલા ની માળો પરીપકવ થયે કાળજી પુર્વક ઉતારી લેવી.
	શેરડી	- જમીનની પ્રત મુજબ ૬ થી ૭ દિવસે પીયત આપવું.
	ઘઉં	- ઘઉંના પાકને કટોકટી અવસ્થા જેવીકે તંતુ મુળ (વાવેતર બાદ -૨૧ દિવસે) કુટ અવસ્થા (વાવેતર બાદ ૩૦ થી ૩૫ દિવસે) અને ગાભા અવસ્થાએ (વાવેતર બાદ ૪૦ થી ૪૫ દિવસે) અવશ્ય પીયત આપવું
	શાકભાજી	- રીંગણી, મરચી, ટમેટા જેવા પાકોને ઠંડીની અસરથી બચાવવા સાંજના સમયે પીયત આપવું

Phone: 0285-2670139

Date: 15-01-2013

(Period 16 January to 20 January -2013)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	000.0
Maximum temperature °C	28.5-33.0
Minimum temperature °C	11.4-15.0
RH % (Morning/Afternoon)	69-24
Wind speed (Kmph)	4.0-5.0
Cloud cover	0-0

Weather forecast for Junagadh Dist. until 0830 hrs of 20- 01-2013

Parameters	Day-1 16-01-13	Day-2 17-01-13	Day-3 18-01-13	Day-4 19-01-13	Day-5 20-01-13
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	32	31	28	26	27
Minimum temperature °C	23	23	21	19	19
Cloud cover (Okta)	8	6	0	1	0
RH % (Morning/After noon)	81-65	88-68	48-40	48-34	37-19
Wind speed (Kmph)	018	015	025	018	022
Wind direction(Deg)	346	315	306	19	27

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Maize	-	- Harvest the fodder purpose maize crop in time.
Castor	Harvesting	- The ripening spiklets should be harvest in time.
Sugarcane	-	- Apply irrigation at an interval of 6 to 7 day
Wheat	-	- If there is limited source of irrigation water, apply irrigation to the crop at the critical stages like crown root irrigation, (21 DAS), tillering (30 to 35 DAS) and booting stages (40 to 45 DAS).
Vegetable	-	- For the protection against cold effect, apply irrigation to the crop like chilly brinjal and tomato.

Porbandar

Phone : 0285-2670139

Date 15-01-2013

(Period 16 January to 20 January -2013)

Weather forecast for Porbandar Dist. until 0830 hrs of 20-01-2013

Parameters	Day-1 16-01-13	Day-2 17-01-13	Day-3 18-01-13	Day-4 19-01-13	Day-5 20-01-13
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	31	29	27	26	27
Minimum temperature °C	15	15	14	14	14
Cloud cover (Okta)	8	6	0	0	0
RH % (Morning/After noon)	92-56	94-69	51-37	57-26	27-12
Wind speed (Kmph)	012	010	015	012	013
Wind direction(Deg)	356	334	313	21	27

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Maize	-	- Harvest the fodder purpose maize crop in time.
Castor	Harvesting	- The ripening spiklets should be harvest in time.
Sugarcane	-	- Apply irrigation at an interval of 6 to 7 day
Wheat	-	- If there is limited source of irrigation water, apply irrigation to the crop at the critical stages like crown root irrigation, (21 DAS), tillering (30 to 35 DAS) and booting stages (40 to 45 DAS).
Vegetable	-	- For the protection against cold effect, apply irrigation to the crop like chilli brinjal and tometo.