

પત્રક—અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન

(સમય તા : ૧૬.૦૨.૧૩ થી ૨૦.૦૨.૧૩)

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાકિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	૦૦૦.૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગે.)	૩૬.૬
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૭.૬
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	૫૪-૧૬
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૨.૭

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૨૦.૦૨.૧૩ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૧૬.૦૨.૧૩	૦	૦
	૧૭.૦૨.૧૩	૦	૦
	૧૮.૦૨.૧૩	૦	૦
	૧૯.૦૨.૧૩	૦	૦
	૨૦.૦૨.૧૩	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૬.૦૨.૧૩	૩૦	૩૨
	૧૭.૦૨.૧૩	૨૮	૨૮
	૧૮.૦૨.૧૩	૨૯	૨૯
	૧૯.૦૨.૧૩	૩૧	૩૧
	૨૦.૦૨.૧૩	૩૩	૩૩
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૬.૦૨.૧૩	૧૭	૧૯
	૧૭.૦૨.૧૩	૧૬	૧૮
	૧૮.૦૨.૧૩	૧૬	૧૮
	૧૯.૦૨.૧૩	૧૭	૧૯
	૨૦.૦૨.૧૩	૧૭	૧૯
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૧૬.૦૨.૧૩	મોટેભાગે ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૧૭.૦૨.૧૩	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૧૮.૦૨.૧૩	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૧૯.૦૨.૧૩	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૨૦.૦૨.૧૩	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
મહત્તમ ભેજ (%)	૧૬.૦૨.૧૩	૬૬	૬૭
	૧૭.૦૨.૧૩	૫૬	૬૦
	૧૮.૦૨.૧૩	૫૯	૬૦
	૧૯.૦૨.૧૩	૪૩	૩૧
	૨૦.૦૨.૧૩	૪૭	૩૫
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૧૬.૦૨.૧૩	૪૬	૩૭
	૧૭.૦૨.૧૩	૪૮	૪૧
	૧૮.૦૨.૧૩	૩૭	૨૯
	૧૯.૦૨.૧૩	૪૨	૨૯
	૨૦.૦૨.૧૩	૪૬	૩૩
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૬.૦૨.૧૩	૦૨૭	૦૧૯
	૧૭.૦૨.૧૩	૦૧૬	૦૧૦
	૧૮.૦૨.૧૩	૦૧૨	૦૦૮
	૧૯.૦૨.૧૩	૦૧૬	૦૦૯
	૨૦.૦૨.૧૩	૦૧૭	૦૧૨
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૧૬.૦૨.૧૩	૩૦૮	૩૧૮
	૧૭.૦૨.૧૩	૨૦૨	૧૧
	૧૮.૦૨.૧૩	૨૯	૫૧
	૧૯.૦૨.૧૩	૧૭	૨૯
	૨૦.૦૨.૧૩	૫૦	૧૬

પત્રક-ક

જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ

બેત આબોહવાકિય વિસ્તાર	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	ધાણા/જીરૂ	- પાક પરિપકવ થયે કાપણી કરવી. - પાકમાં કાળી ચરમીનાા રોગના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૩૦ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો.
	ઘઉં	- ઘઉંના પાકને પોક અવસ્થાએ અવશ્ય પીયત આપવું .
	લસણ	- લસણના પાકના ગાઠીયાની વિકાસ અવસ્થાએ અવશ્ય પીયત આપવું .
	ઉનાળુ મગફળી	- જો પિયતની પુરતી સગવડ હોય તો ઉનાળુ મગફળી ની જાતો જેવી કે જી.જી.-૨, જી.જી.-૪ અથવા ટીજી-૨૬ નું વાવેતર કરવું
	કલમી બોર	- બોરના પુખ્ત ઝાડને ૧૫ દિવસે પિયત આપવું. - પરિપકવ ફળો ઉતારી, ગ્રેડીંગ કરી બજારમા મુકવા.
	જામફળ	- પરિપકવ ફળો ઉતારી, ગ્રેડીંગ કરી બજારમા મુકવા. - ઝાડને જરૂરીયાત મુજબ પિયત આપવું.

Junagadh

Phone: 0285-2670139

Date: 15-02-2013

(Period 16 February to 20 February -2013)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	000.0
Maximum temperature °C	36.5-37.0
Minimum temperature °C	16.6-19.5
RH % (Morning/Afternoon)	54-16
Wind speed (Kmph)	2.1-3.8
Cloud cover	2-6

Weather forecast for Junagadh Dist. until 0830 hrs of 20- 02-2013

Parameters	Day-1 16-02-13	Day-2 17-02-13	Day-3 18-02-13	Day-4 19-02-13	Day-5 20-02-13
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	30	28	29	31	33
Minimum temperature °C	17	16	16	17	17
Cloud cover (Okta)	1	0	0	0	0
RH % (Morning/After noon)	66-46	56-48	59-37	43-42	47-46
Wind speed (Kmph)	027	016	012	016	017
Wind direction(Deg)	308	202	29	17	50

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Coriander/Cumin	Physio maturity	<ul style="list-style-type: none">- The crop should be harvested in time.- For the control of blight disease, spray Mencozeb @ 30 gm. in 10 liters of water.
Wheat	Dough stage	<ul style="list-style-type: none">- Apply irrigation to the crop at dough stage.
Garlic	Bulb formation	<ul style="list-style-type: none">- The crop should be irrigated at the time of bulb development.
Summer Groundnut	-	<ul style="list-style-type: none">- If irrigation facility is available, sowing operation should be carried out by selecting variety either GG-2, GG-5 or TG- 26.
Grafted Ber	-	<ul style="list-style-type: none">- Apply irrigation at an interval of 15 days- Harvest the fruits, grading it and then sent to the market.
Guava	-	<ul style="list-style-type: none">- Harvest the fruit, after grading then put in to market.- Apply irrigation as and when required.

Porbandar

Phone : 0285-2670139

Date : 15-02-2013

(Period 16 February to 20 February -2013)

Weather forecast for **Porbandar** Dist. until 0830 hrs of 20-02-2013

Parameters	Day-1 16-02-13	Day-2 17-02-13	Day-3 18-02-13	Day-4 19-02-13	Day-5 20-02-13
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	32	28	29	31	33
Minimum temperature °C	19	18	18	19	19
Cloud cover (Okta)	0	0	0	0	0
RH % (Morning/After noon)	67-37	60-41	60-29	31-29	35-33
Wind speed (Kmph)	019	010	008	009	012
Wind direction(Deg)	318	11	51	29	16

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Coriander/Cumin	Physio maturity	<ul style="list-style-type: none">- The crop should be harvested in time.- For the control of blight disease, spray Mencozeb @ 30 gm. in 10 liters of water.
Wheat	Dough stage	<ul style="list-style-type: none">- Apply irrigation to the crop at dough stage.
Garlic	Bulb formation	<ul style="list-style-type: none">- The crop should be irrigated at the time of bulb development.
Summer Groundnut	-	<ul style="list-style-type: none">- If irrigation facility is available, sowing operation should be carried out by selecting variety either GG-2, GG-5 or TG- 26.
Grafted Ber	-	<ul style="list-style-type: none">- Apply irrigation at an interval of 15 days- Harvest the fruits, grading it and then sent to the market.
Guava	-	<ul style="list-style-type: none">- Harvest the fruit, after grading then put in to market.- Apply irrigation as and when required.