

પત્રક—અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
(સમય તા: ૧૭.૧૨.૧૦ થી ૨૧.૧૨.૧૦)

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાકિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	000.0
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	29.5
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	10.2
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	80-32
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	2.1

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૨૧.૧૨.૧૦ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૧૭.૧૨.૧૦	૦	૦
	૧૮.૧૨.૧૦	૦	૦
	૧૯.૧૨.૧૦	૦	૦
	૨૦.૧૨.૧૦	૦	૦
	૨૧.૧૨.૧૦	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૭.૧૨.૧૦	૨૯	૨૯
	૧૮.૧૨.૧૦	૨૯	૨૯
	૧૯.૧૨.૧૦	૩૦	૨૯
	૨૦.૧૨.૧૦	૩૧	૩૦
	૨૧.૧૨.૧૦	૩૦	૩૦
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૭.૧૨.૧૦	૧૪	૧૫
	૧૮.૧૨.૧૦	૧૫	૧૪
	૧૯.૧૨.૧૦	૧૪	૧૪
	૨૦.૧૨.૧૦	૧૫	૧૫
	૨૧.૧૨.૧૦	૧૪	૧૫
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	૧૭.૧૨.૧૦	Clear	Clear
	૧૮.૧૨.૧૦	Clear	Clear
	૧૯.૧૨.૧૦	Clear	Clear
	૨૦.૧૨.૧૦	Clear	Clear
	૨૧.૧૨.૧૦	Clear	Clear
મહત્તમ ભેજ (%)	૧૭.૧૨.૧૦	૪૧	૩૩
	૧૮.૧૨.૧૦	૩૬	૩૦
	૧૯.૧૨.૧૦	૩૫	૨૬
	૨૦.૧૨.૧૦	૩૦	૨૮
	૨૧.૧૨.૧૦	૩૧	૩૦
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૧૭.૧૨.૧૦	૨૪	૨૨
	૧૮.૧૨.૧૦	૨૨	૨૦
	૧૯.૧૨.૧૦	૨૦	૧૬
	૨૦.૧૨.૧૦	૨૧	૧૬
	૨૧.૧૨.૧૦	૨૪	૨૮
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૭.૧૨.૧૦	૦૧૧	૦૧૨
	૧૮.૧૨.૧૦	૦૧૧	૦૧૨
	૧૯.૧૨.૧૦	૦૧૨	૦૧૪
	૨૦.૧૨.૧૦	૦૧૩	૦૧૫
	૨૧.૧૨.૧૦	૦૧૦	૦૧૩
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૧૭.૧૨.૧૦	૦૪૦	૦૪૦
	૧૮.૧૨.૧૦	૦૪૦	૦૪૦
	૧૯.૧૨.૧૦	૦૪૦	૦૪૦
	૨૦.૧૨.૧૦	૦૫૦	૦૫૦
	૨૧.૧૨.૧૦	૦૪૦	૦૫૦

પત્રક-ક
જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ

ખેત આબોહવાકિય વિસ્તાર	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	કપાસ	૧. કપાસ જેમ પાકતો જાય તેમ તેની વીણી કરતા રહેવી. ૨. કપાસના પાકને જરૂરિયાત મુજબ પાણી આપવું.
	ઝેરડા	૧. ઝેરડાના પાકમા મોલોમસી, તરતડીયા, ગ્રિયસ અને સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે ટ્રાયઝોફોસ ૨૦ મી.લી. અથવા મિથાઈલ-ઓ-ડિડિમેટોન અથવા મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ ઈ.સી. ૧૨ મી.લી. ૧૦ લીટર પાણીમા ભેળવી છંટકાવ કરવો. ૨. દિવેલાની લુમો પરીપકવ થાય એટલે કાળજીપુર્વક લણણી કરી લેવી.
	ઘઉં	૧. ઘઉંના પાકમા ભુખરા ચુસીયા નો ઉપદ્રવ જણાયતો મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ ઈ.સી. ૧૨ મીલી. અથવા એન્ડોસલ્ફાન ૩૫ ઈ.સી. ૨૦ મીલી.દવા ૧૦ લીટર પાણીમા ભેળવી છંટકાવ કરવો.
	શેરડી	૧. શેરડીના પાકને જમીનની પ્રત મુજબ ૬ થી ૭ દિવસે પિયત આપવું. ૨. પાકનો વાવેતર સમય ધ્યાને લઈને પુર્તિ ખાતરનો પ્રથમ હપ્તો એક થી દોઢ માસે હેક્ટરે ૧૬૨ કિગ્રા. યુરીયા (૨૭ કિગ્રા. પ્રતિ વીઘા) અથવા ૩૭૫ કિગ્રા. એમોનીયમ સલ્ફેટ (૬૦ કિગ્રા. પ્રતિ વીઘા) આપવું.
	જીરૂ તથા ધાણા	૧. જીરૂના પાકમા ચરમી રોગના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ દવા ૨૫ ગ્રામ ૧૦ લી. પાણીમા ભેળવી છંટકાવ કરવો. ૨. જીરૂ તથા ધાણાના પાકમા ભુકીછારા રોગના નિયંત્રણ માટે ડીનોકેપ ૪૮ ઈ.સી. ૧૦ મીલી. અથવા દ્રુવ્ય ગંધક ૮૦% વે.પા. ૩૦ ગ્રામ ૧૦ લી. પાણીમા ભેળવી છંટકાવ કરવો.
	શાકભાજી પાકો	૧. મરચીની રોપણી બાદ ચુસીયા પ્રકારની જીવાતના નિયંત્રણ માટે દાણાદાર ફોરેટ અથવા થીમેટ ૧૦જી છોડદીઠ ૨ગ્રામ જમીનમા આપવું.
	આંબો	૧. આંબાના પાકમા મઘીયા જીવાતના નિયંત્રણ માટે મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ ઈ.સી. ૧૦ મીલી. અથવા કાર્બારીલ ૫૦% વે.પા ૪૦ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમા ભેળવી છંટકાવ કરવો. ભલામણ કરેલ સાંદ્રતા મુજબ જ છંટકાવ કરવો વધુ સાંદ્રતા વાળા દ્રુવણનો ઉપયોગ કરવાથી ફળ બેસવા ઉપર માઠી અસર થાય છે.