

પત્રક—અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
(સમય તા : ૨૩.૧૦.૧૩ થી તા : ૨૭.૧૦.૧૩)

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાક્રિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	0.00
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગે.)	36.2
લઘુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	23.5
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	84-31
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	2.0

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૨૭.૧૦.૧૩ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૨૩.૧૦.૧૩	૦	૦
	૨૪.૧૦.૧૩	૦	૦
	૨૫.૧૦.૧૩	૦	૦
	૨૬.૧૦.૧૩	૦	૦
	૨૭.૧૦.૧૩	૬	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૩.૧૦.૧૩	૩૧	૩૩
	૨૪.૧૦.૧૩	૩૧	૩૩
	૨૫.૧૦.૧૩	૩૨	૩૪
	૨૬.૧૦.૧૩	૩૩	૩૪
	૨૭.૧૦.૧૩	૩૪	૩૫
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૩.૧૦.૧૩	૨૨	૨૨
	૨૪.૧૦.૧૩	૨૨	૨૨
	૨૫.૧૦.૧૩	૨૧	૨૧
	૨૬.૧૦.૧૩	૨૧	૨૧
	૨૭.૧૦.૧૩	૨૧	૨૧
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૨૩.૧૦.૧૩	ચોખ્ખુ આકાશ	ચોખ્ખુ આકાશ
	૨૪.૧૦.૧૩	ચોખ્ખુ આકાશ	ચોખ્ખુ આકાશ
	૨૫.૧૦.૧૩	ચોખ્ખુ આકાશ	ચોખ્ખુ આકાશ
	૨૬.૧૦.૧૩	મોટે ભાગે ચોખ્ખુ	મોટે ભાગે ચોખ્ખુ
	૨૭.૧૦.૧૩	અશતં: વાદળછાયુ	અશતં: વાદળછાયુ
મહત્તમ ભેજ (%)	૨૩.૧૦.૧૩	૫૬	૫૦
	૨૪.૧૦.૧૩	૫૩	૪૫
	૨૫.૧૦.૧૩	૫૧	૪૪
	૨૬.૧૦.૧૩	૬૩	૫૮
	૨૭.૧૦.૧૩	૭૮	૭૭
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૨૩.૧૦.૧૩	૪૭	૩૭
	૨૪.૧૦.૧૩	૪૨	૩૫
	૨૫.૧૦.૧૩	૪૩	૩૪
	૨૬.૧૦.૧૩	૪૯	૪૦
	૨૭.૧૦.૧૩	૬૧	૫૮
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૨૩.૧૦.૧૩	૦૧૮	૦૧૫
	૨૪.૧૦.૧૩	૦૨૩	૦૨૨
	૨૫.૧૦.૧૩	૦૨૪	૦૨૨
	૨૬.૧૦.૧૩	૦૨૦	૦૧૯
	૨૭.૧૦.૧૩	૦૧૧	૦૦૯
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૨૩.૧૦.૧૩	૩૨	૪૦
	૨૪.૧૦.૧૩	૪૧	૪૧
	૨૫.૧૦.૧૩	૩૬	૩૬
	૨૬.૧૦.૧૩	૪૮	૪૭
	૨૭.૧૦.૧૩	૧૨૦	૧૨૪

જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ

ખેત આબોહવાકિય વિસ્તાર	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
	કપાસ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ કપાસ મા ચુસીયા પ્રકાર ની જીવાત ના નિયંત્રણ માટે ડાઈમીથોથેટ ૧૫ મીલી/૧૫ લિટર પાણી અથવા મીથાઈલઓડેમેટોન ૩૦ મીલી/૧૫ લિટર પાણી અથવા ઈમીડાક્લોપ્રાઈડ ૫ મીલી/૧૫ લિટર પાણી નો છંટકાવ કરવો. ❖ પાક મા ફુલો અને અપરીપક્વ જીંડવા ને ખરતા અટકવાવવા માટે નેપ્થેલિક એસીટીક એસીડ ૭ મીલી/ ૧૦ લીટર પાણી મા મીશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
	દીવેલા	<ul style="list-style-type: none"> ➤ પાક ૪૦ દીવસ નો થાય ત્યારે પુરતી ખાતર નો પ્રથમ હપ્તો હેક્ટરે ૪૧ કીલો ચુરીયા પ્રમાણે આપવું
	ભીંડો	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ડુખ અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ નીયંત્રણ માટે લીમ્બોળી ના બીજ નો અકુ ૫૦૦ મીલી અથવા લીમ્બોળી નુ તેલ ૫૦ મીલી ૧૦ લિટર પાણી મા ઓગાળી ૧૫ દીવસ ના અંતરે ૪ છંટકાવ કરવા. ➤ પાક મા માઈટ ના નીયંત્રણ માટે ડાઈકોફોલ દવા ૨૦ મીલી /૧૦ લીટર પાણી મા મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.
	મરચા	<ul style="list-style-type: none"> ✓ પાક મા સુકારા ના રોગ ના નિયંત્રણ માટે ટ્રાઈકોડરમા વિરીડી ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણી મા ઓગાળી છોડ ના થડ પાસે ડ્રેથિંગ કરવું.
	દાડમ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ દાડમ મા રસ ચુસનાર કુદા ના નીયંત્રણ માટે કંરજ તેલ, નેપાળો(રતન જ્યોત) તેલ અથવા લીમ્બોળી નુ તેલ ૪૦ મીલી/ ૧૦ લીટર લીટર પાણી મા ઓગાળી છંટકાવ કરવો .
	પશુપાલન	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ઈતરડી ના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રિન અથવા એમીટાજ દવા ૧૦ લિટર પાણી મા નાખી છંટકાવ કરવો. ❖ પુખ્ત પશુ ને ૬ થી ૮ કિલો સારી ગુણવત્તા વાલો સુકો ચારો અને ૧૫ થી ૨૦ કીલો લીલો ચારો આપવો . ❖ ચોમાસા દરમિયાન જાનવરોને માખીઓ અને મછરોના ઉપદ્રવ થી બચાવવા જાનવરો ના રહેઠાણ ની જગ્યાએ ફીનાઈલ નો છંટકાવ કરવો

(Period 23 to 27 October -2013)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	0.00
Maximum temperature °C	35.2-36.5
Minimum temperature °C	22.2-24.5
RH % (Morning/Afternoon)	84-31
Wind speed (Kmph)	1.0-3.3
Cloud cover	1-5

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 27- 10-2013

Parameters	Day-1 23-10-13	Day-5 24-10-13	Day-5 25-10-13	Day-5 26-10-13	Day-5 27-10-13
Rain fall (mm)	0	0	0	0	6
Maximum temperature °C	31	31	32	33	34
Minimum temperature °C	22	22	21	21	21
Cloud cover (Okta)	1	1	1	2	4
RH % (Morning/After noon)	56-47	53-42	51-43	63-49	78-61
Wind speed (Kmph)	018	023	024	020	011
Wind direction(Deg)	32	41	36	48	120

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Cotton	Boll formation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ For the control of sucking pest, spray either Dimethoate @ 15 ml/ 15 liter water or Methyl-o-demeton @ 30 ml/ 15 liter water or Imidaclopride @ 5 ml/15 liter water. ▪ To reduce dropping of flower and immature balls, spray Nephthelic acetic Acid in 10 liter of water.
Castor	Capsule foemation	Apply N fertilizer as top dressing @41 kg urea/ ha after 40 DAS.
Ladies Finger	Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> ❖ For the control of Shoot and fruit borer, spray neem seed extract 500ml or neem seed oil 50 ml/10 liter of water at 15 days interval (total 4 spray). ❖ For the control of mite, spray dicofol @20 ml/10 lit. of water
Chili	Fruiting	❖ For the control of wilting disease, drenching of <i>Tricoderma viride</i> @40 gm/10 liter of water
Pomegranate	Fruiting	❖ For the control of fruit sucking moth, spray neem oil 40ml/10 lit. of water.
Live stocks	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of tick, spray Deltamathrin or Amitaz 20 ml/10 liter of water. ➤ Provide 6-8 kg of good quality of dry fodder with 15 to 20 kg green fodder to animal. ➤ Spry phenyl in animal shed to protect the animals against flays and mosquitoes

PORBANDAR

Phone : 0285-2670139

Date : 22-10-2013

(Period 23 to 27 October -2013)

Weather forecast for **Porbandar** Dist. until 08:30 hrs of 27- 10-2013

Parameters	Day-1 23-10-13	Day-5 24-10-13	Day-5 25-10-13	Day-5 26-10-13	Day-5 27-10-13
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	33	33	34	34	35
Minimum temperature °C	22	22	21	21	21
Cloud cover (Okta)	1	1	1	2	4
RH % (Morning/After noon)	50-37	45-35	44-34	58-40	77-58
Wind speed (Kmph)	015	022	022	019	009
Wind direction(Deg)	40	41	36	47	124

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Cotton	Squiring/Boll formation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ For the control of sucking pest, spray either Dimethoate @ 15 ml/ 15 liter water or Methyl-o-demeton @ 30 ml/ 15 liter water or Imidaclopride @ 5 ml/15 liter water. ▪ To reduce dropping of flower and immature balls, spray Nephthelic acetic Acid in 10 liter of water.
Castor	Capsule foemation	Apply N fertilizer as top dressing @41 kg urea/ ha after 40 DAS.
Ladies Finger	Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> ❖ For the control of Shoot and fruit borer, spray neem seed extract 500ml or neem seed oil 50 ml/10 liter of water at 15 days interval (total 4 spray). ❖ For the control of mite, spray dicofol @20 ml/10 lit. of water
Chili	Fruiting	❖ For the control of wilting disease, drenching of <i>Tricoderma viride</i> @40 gm/10 liter of water
Pomegranate	Fruiting	❖ For the control of fruit sucking moth, spray neem oil 40ml/10 lit. of water.
Live stocks	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of tick, spray Deltamathrin or Amitaz 20 ml/10 liter of water. ➤ Provide 6-8 kg of good quality of dry fodder with 15 to 20 kg green fodder to animal. ➤ Spry phenyl in animal shed to protect the animals against flays and mosquitoes