

## પત્રક-અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૂષિ સલાહ બુલેટીન

( સમય તા : ૨૫.૦૧.૧૩ થી ૨૮.૦૧.૧૩ )

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૂષિ આબોહવાકિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌચાખ્ર
વરસાદ (મીમી)	000.0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગે.)	31.0
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગે.)	12.0
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	42-11
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	5.4

## પત્રક-૬ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા. ૨૮.૦૧.૧૩ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૨૫.૦૧.૧૩	૦	૦
	૨૬.૦૧.૧૩	૦	૦
	૨૭.૦૧.૧૩	૦	૦
	૨૮.૦૧.૧૩	૦	૦
	૨૯.૦૧.૧૩	૦	૦
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૫.૦૧.૧૩	૩૨	૩૧
	૨૬.૦૧.૧૩	૩૨	૩૧
	૨૭.૦૧.૧૩	૩૨	૩૧
	૨૮.૦૧.૧૩	૩૨	૩૧
	૨૯.૦૧.૧૩	૩૨	૩૧
લઘૃતમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૫.૦૧.૧૩	૧૬	૧૮
	૨૬.૦૧.૧૩	૧૬	૧૮
	૨૭.૦૧.૧૩	૧૭	૧૯
	૨૮.૦૧.૧૩	૧૭	૧૯
	૨૯.૦૧.૧૩	૧૭	૧૯
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટો)	૨૫.૦૧.૧૩	ચોખ્યં	ચોખ્યં
	૨૬.૦૧.૧૩	ચોખ્યં	ચોખ્યં
	૨૭.૦૧.૧૩	ચોખ્યં	ચોખ્યં
	૨૮.૦૧.૧૩	ચોખ્યં	ચોખ્યં
	૨૯.૦૧.૧૩	ચોખ્યં	ચોખ્યં
મહત્વમાન ભેજ (%)	૨૫.૦૧.૧૩	૩૧	૨૧
	૨૬.૦૧.૧૩	૩૩	૨૧
	૨૭.૦૧.૧૩	૩૪	૨૨
	૨૮.૦૧.૧૩	૩૪	૨૨
	૨૯.૦૧.૧૩	૪૪	૩૧
લઘૃતમાન ભેજ (%)	૨૫.૦૧.૧૩	૩૦	૨૦
	૨૬.૦૧.૧૩	૨૫	૧૮
	૨૭.૦૧.૧૩	૨૮	૨૧
	૨૮.૦૧.૧૩	૨૦	૧૬
	૨૯.૦૧.૧૩	૩૯	૨૩
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૨૫.૦૧.૧૩	૨૩	૧૫
	૨૬.૦૧.૧૩	૨૩	૧૫
	૨૭.૦૧.૧૩	૨૧	૧૩
	૨૮.૦૧.૧૩	૧૫	૧૧
	૨૯.૦૧.૧૩	૧૪	૧૦
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	૨૫.૦૧.૧૩	૩૦	૩૧
	૨૬.૦૧.૧૩	૨૬	૨૮
	૨૭.૦૧.૧૩	૨૮	૩૪
	૨૮.૦૧.૧૩	૩૪	૪૩
	૨૯.૦૧.૧૩	૧૮	૨૭

**પત્રક-૫**  
**જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ**

ખેત આબોહવાક્ય વિસ્તાર	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	જીરુ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- પાકમાં કાળી ચરમીના રોગના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૩૦ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી ૧૦ થી ૧૨ દિવસ ના અંતરે છંટકાવ કરવો.</li> <li>- પાકમાં ભૂકીછારા રોગના નિયંત્રણ માટે હેક્ઝાકોનેઝોલ ૧૦ મી.લી. ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી ૧૦ થી ૧૨ દિવસ ના અંતરે છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
	ઘઉ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ઘઉના પાકને કટોકટી અવસ્થા જેવીકે ફૂટ અવસ્થા (વાવેતર બાદ ૩૦ થી ૩૫ દિવસે) અને ગાભા અવસ્થાએ (વાવેતર બાદ ૪૦ થી ૪૫ દિવસે) અવશ્ય પીયત આપવું</li> </ul>
	દિવેલા	<ul style="list-style-type: none"> <li>- દિવેલા ની માળો પરિપક્વ થયે કાળજી પૂર્વક ઉતારી લેવી.</li> </ul>
	ઉનાળું મગફળી અને મગ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- જો પિયતની સગવડ હોય તો ઉનાળું મગફળી અને મગ ના વાવેતર માટે જમીન ખેડી તૈયાર કરવી.</li> </ul>
	કલમી બોર	<ul style="list-style-type: none"> <li>- બોરના પુખ્ત આડને ૧૫ દિવસે પિયત આપવું.</li> <li>- પરિપક્વ ફળો ઉતારી, ગ્રેડીંગ કરી બજારમા મુકવા.</li> </ul>

(Period 25 January to 29 January -2013)

**Significant weather for the preceding week**

Rain fall (mm)	000.0
Maximum temperature °C	31.4-30.4
Minimum temperature °C	9.4-14.4
RH % (Morning/Afternoon)	42-11
Wind speed (Kmph)	4.6-6.0
Cloud cover	0-0

**Weather forecast for Junagadh Dist. until 0830 hrs of 29- 01-2013**

Parameters	Day-1 25-01-13	Day-2 26-01-13	Day-3 27-01-13	Day-4 28-01-13	Day-5 29-01-13
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	32	32	32	32	32
Minimum temperature °C	16	16	17	17	17
Cloud cover (Okta)	0	0	0	1	0
RH % (Morning/After noon)	31-30	33-25	34-28	34-20	44-39
Wind speed (Kmph)	023	023	021	015	014
Wind direction(Deg)	30	26	28	34	18

**Agro meteorological Advisories**

Crop	Stage	Agromet Advisories
Cumin	Flowering	<ul style="list-style-type: none"> <li>- For the control of blight disease, spray Mencozeb @ 30 gm. in 10 liters of water at an interval of 10 to 12 days..</li> <li>- For the control of powdery mildew disease, spray Hexaconazole @10 ml/10 liters of water at an interval of 10 to 12 days.</li> </ul>
Wheat	Tillering/Booting	<ul style="list-style-type: none"> <li>- If there is limited source of irrigation water, apply irrigation to the crop at the critical stages like tillering and booting stages.</li> </ul>
Castor	Maturity	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The ripening spiklets should be harvested in time.</li> </ul>
Summer Groundnut and Mungbean	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- If irrigation facility is available, prepare the land for the sowing of summer groundnut and mungbean crops.</li> </ul>
Grafted Ber	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apply irrigation at an interval of 15 days</li> <li>- Harvest the fruits, grading it and then sent to the market.</li> </ul>

## Porbandar

Phone : 0285-2670139

Date :-24-01-2013

(Period 25 January to 29 January -2013)

**Weather forecast for Porbandar Dist. until 0830 hrs of 29-01-2013**

Parameters	Day-1 25-01-13	Day-2 26-01-13	Day-3 27-01-13	Day-4 28-01-13	Day-5 29-01-13
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	31	31	31	31	31
Minimum temperature °C	18	18	19	19	19
Cloud cover (Okta)	0	0	0	0	0
RH % (Morning/After noon)	21-20	21-18	22-21	22-16	31-23
Wind speed (Kmph)	15	15	13	11	10
Wind direction(Deg)	31	28	34	43	27

### Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Cumin	Flowering	<ul style="list-style-type: none"> <li>- For the control of blight disease disease, spray Mencozeb @ 30 gm. in 10 liters of water at an interval of 10 to 12 days..</li> <li>- For the control of powdery mildew disease, spray Hexaconazole @10 ml/10 liters of water at an interval of 10 to 12 days.</li> </ul>
Wheat	Tillering/Booting	<ul style="list-style-type: none"> <li>- If there is limited source of irrigation water, apply irrigation to the crop at the critical stages like tillering and booting stages.</li> </ul>
Castor	Maturity	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The ripening spiklets should be harvested in time.</li> </ul>
Summer Groundnut and Mungbean	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- If irrigation facility is available, prepare the land for the sowing of summer groundnut and mungbean crops.</li> </ul>
Grafted Ber	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apply irrigation at an interval of 15 days</li> <li>- Harvest the fruits, grading it and then sent to the market.</li> </ul>