

પત્રક—અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન

(સમય તા : ૨૯.૦૧.૧૩ થી ૦૩.૦૨.૧૩)

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાકિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	૦૦૦.૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગે.)	૩૨.૭
લઘુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૧.૬
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	૫૯-૧૯
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૩.૮

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૦૩.૦૨.૧૩ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૩૦.૦૧.૧૩	૦	૦
	૩૧.૦૧.૧૩	૦	૦
	૦૧.૦૨.૧૩	૦	૦
	૦૨.૦૨.૧૩	૦	૦
	૦૩.૦૨.૧૩	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૩૦.૦૧.૧૩	૨૯	૩૧
	૩૧.૦૧.૧૩	૨૯	૩૧
	૦૧.૦૨.૧૩	૨૯	૩૦
	૦૨.૦૨.૧૩	૨૯	૩૦
	૦૩.૦૨.૧૩	૨૯	૩૧
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૩૦.૦૧.૧૩	૧૬	૧૪
	૩૧.૦૧.૧૩	૧૬	૧૪
	૦૧.૦૨.૧૩	૧૫	૧૩
	૦૨.૦૨.૧૩	૧૬	૧૩
	૦૩.૦૨.૧૩	૧૬	૧૪
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૩૦.૦૧.૧૩	મોટેભાગે વાદળછાયુ	વાદળછાયુ
	૩૧.૦૧.૧૩	અંશતઃ વાદળછાયુ	અંશતઃ વાદળછાયુ
	૦૧.૦૨.૧૩	ચોખ્ખું	અંશતઃ વાદળછાયુ
	૦૨.૦૨.૧૩	ચોખ્ખું	મોટેભાગે ચોખ્ખું
	૦૩.૦૨.૧૩	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
મહત્તમ ભેજ (%)	૩૦.૦૧.૧૩	૬૨	૭૦
	૩૧.૦૧.૧૩	૭૫	૮૪
	૦૧.૦૨.૧૩	૭૪	૮૭
	૦૨.૦૨.૧૩	૭૬	૯૧
	૦૩.૦૨.૧૩	૭૨	૮૧
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૩૦.૦૧.૧૩	૫૨	૪૪
	૩૧.૦૧.૧૩	૫૨	૪૫
	૦૧.૦૨.૧૩	૫૩	૪૦
	૦૨.૦૨.૧૩	૫૦	૩૦
	૦૩.૦૨.૧૩	૭૧	૭૧
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૩૦.૦૧.૧૩	૦૦૯	૦૦૩
	૩૧.૦૧.૧૩	૦૦૭	૦૦૫
	૦૧.૦૨.૧૩	૦૧૦	૦૦૬
	૦૨.૦૨.૧૩	૦૧૬	૦૧૧
	૦૩.૦૨.૧૩	૦૧૨	૦૦૮
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	૩૦.૦૧.૧૩	૨૯૮	૧૨૦
	૩૧.૦૧.૧૩	૩૧૦	૧૯૨
	૦૧.૦૨.૧૩	૩૦૧	૨૯૭
	૦૨.૦૨.૧૩	૩૧૯	૩૩૫
	૦૩.૦૨.૧૩	૩૨૬	૨૨૯

પત્રક-ક
જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ

પોષવાકિય પ્રકાર	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
સૌરાષ્ટ્ર	જીરૂ	<ul style="list-style-type: none"> - પાકમાં કાળી ચરમીના રોગના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૩૦ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી ૧૦ થી ૧૨ દિવસ ના અંતરે છંટકાવ કરવો. - પાકમાં ભુકીછારા રોગના નિયંત્રણ માટે હેકઝાકોનેઝોલ ૧૦ મી.લી. ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી ૧૦ થી ૧૨ દિવસ ના અંતરે છંટકાવ કરવો.
	ઘઉં	<ul style="list-style-type: none"> - ઘઉંના પાકને કટોકટી અવસ્થા જેવીકે ફુટ અવસ્થા (વાવેતર બાદ ૩૦ થી ૩૫ દિવસે) અને ગાભા અવસ્થાએ (વાવેતર બાદ ૪૦ થી ૪૫ દિવસે) અવશ્ય પીયત આપવું
	દિવેલા	<ul style="list-style-type: none"> - દિવેલા ની માળો પરિપકવ થયે કાળજી પુર્વક ઉતારી લેવી.
	ઉનાળુ મગફળી અને મગ	<ul style="list-style-type: none"> - જો પિયતની સગવડ હોય તો ઉનાળુ મગફળી અનેમગ ના વાવેતર માટે જમીન ખેડી તૈયાર કરવી.
	કલમી બોર	<ul style="list-style-type: none"> - બોરના પુખ્ત ઝાડને ૧૫ દિવસે પિયત આપવું. - પરિપકવ ફળો ઉતારી, ગ્રેડીંગ કરી બજારમા મુકવા.

Phone: 0285-2670139

Date: 29-01-2013

(Period 30 January to 03 February -2013)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	000.0
Maximum temperature °C	32.1-30.0
Minimum temperature °C	10.0-13.5
RH % (Morning/Afternoon)	59-19
Wind speed (Kmph)	2.9-4.4
Cloud cover	0-0

Weather forecast for Junagadh Dist. until 0830 hrs of 03- 02-2013

Parameters	Day-1 30-01-13	Day-2 31-01-13	Day-3 01-02-13	Day-4 02-02-13	Day-5 03-02-13
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	29	29	29	29	29
Minimum temperature °C	16	16	15	16	16
Cloud cover (Okta)	6	3	0	0	0
RH % (Morning/After noon)	62-52	75-52	74-53	76-50	72-71
Wind speed (Kmph)	009	007	010	016	012
Wind direction(Deg)	298	310	301	319	326

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Cumin	Flowering	<ul style="list-style-type: none">- For the control of blight disease, spray Mencozeb @ 30 gm. in 10 liters of water at an interval of 10 to 12 days..- For the control of powdery mildew disease, spray Hexaconazole @10 ml/10 liters of water at an interval of 10 to 12 days.
Wheat	Tillering/Booting	<ul style="list-style-type: none">- If there is limited source of irrigation water, apply irrigation to the crop at the critical stages like tillering and booting stages.
Castor	Maturity	<ul style="list-style-type: none">- The ripening spiklets should be harvested in time.
Summer Groundnut and Mungbean	-	<ul style="list-style-type: none">- If irrigation facility is available, prepare the land for the sowing of summer groundnut and mungbean crops.
Grafted Ber	-	<ul style="list-style-type: none">- Apply irrigation at an interval of 15 days- Harvest the fruits, grading it and then sent to the market.

Porbandar

Phone : 0285-2670139

Date :-29-01-2013

(Period 30 January to 03 February -2013)

Weather forecast for **Porbandar** Dist. until 0830 hrs of 03-02-2013

Parameters	Day-1 30-01-13	Day-2 31-01-13	Day-3 01-02-13	Day-4 02-02-13	Day-5 03-02-13
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	31	31	30	30	31
Minimum temperature °C	14	14	13	13	14
Cloud cover (Okta)	8	3	5	2	0
RH % (Morning/After noon)	70-44	84-45	87-40	91-30	81-71
Wind speed (Kmph)	003	005	006	011	008
Wind direction(Deg)	120	192	297	335	229

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Cumin	Flowering	<ul style="list-style-type: none">- For the control of blight disease, spray Mencozeb @ 30 gm. in 10 liters of water at an interval of 10 to 12 days..- For the control of powdery mildew disease, spray Hexaconazole @10 ml/10 liters of water at an interval of 10 to 12 days.
Wheat	Tillering/Booting	<ul style="list-style-type: none">- If there is limited source of irrigation water, apply irrigation to the crop at the critical stages like tillering and booting stages.
Castor	Maturity	<ul style="list-style-type: none">- The ripening spiklets should be harvested in time.
Summer Groundnut and Mungbean	-	<ul style="list-style-type: none">- If irrigation facility is available, prepare the land for the sowing of summer groundnut and mungbean crops.
Grafted Ber	-	<ul style="list-style-type: none">- Apply irrigation at an interval of 15 days- Harvest the fruits, grading it and then sent to the market.