

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન

દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ

તા. ૦૨-૧૦-૨૦૧૮ થી તા. ૦૬-૧૦-૨૦૧૮

(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુ.કૃ.ય.)

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન : ૨૦૧૮-૧૯

પાછલા અઠવાડીયાનું જૂનાગઢનું હવામાન

| હવામાન પરીબળો | દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર કૃષિ આબોહવાકીય વિસ્તાર |
|-------------------------|---|
| વરસાદ (મીમી) | ૦૦૦.૦ |
| મહત્વમાન તાપમાન (°સે.) | ૩૭.૦ |
| લઘુત્વમાન તાપમાન (°સે.) | ૨૦.૬ |
| ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ) | ૫૧ - ૩૦ |
| પવનની ગતિ (કિમી/કલાક) | ૦૨.૬ |

પત્રક-૬ : જુલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૮ સુધી)

ભારત સરકારશ્રીના હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલ હવામાન આગાહીની માહીતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા યોજના, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ તરફથી જણાવવામા આવે છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના

૧. જૂનાગઢ:- જુલ્લામા આગામી તારીખ ૦૨/૧૦/૨૦૧૮ થી ૦૬/૧૦/૨૦૧૮ દરમ્યાન આકાશ મુખ્યત્વે આગામી પાંચ દિવસોમાં ચોખ્યું થી મોટેભાગે ચોખ્યું રહેશે, આવતા પાંચ દિવસોમાં વરસાદ ની કોઈ શક્યતાઓ રહેલી નથી. પવનની ઝડપ ૦૮ થી ૧૧ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન ૩૬ થી ૩૭ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્વમાન તાપમાન ૨૩ થી ૨૪ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

૨. પોરબંદર:- જુલ્લામા આગામી તારીખ ૦૨/૧૦/૨૦૧૮ થી ૦૬/૧૦/૨૦૧૮ દરમ્યાન આકાશ મુખ્યત્વે આગામી પાંચ દિવસોમાં ચોખ્યું થી મોટેભાગે ચોખ્યું રહેશે, આવતા પાંચ દિવસોમાં વરસાદ ની કોઈ શક્યતાઓ રહેલી નથી. પવનની ઝડપ ૦૬ થી ૧૧ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન ૩૬ થી ૩૭ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્વમાન તાપમાન ૨૧ થી ૨૨ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

જૂનાગઢ

| હવામાન પરીબળો / તારીખ | દિવસ-૧ ૦૨-૧૦-૨૦૧૮ | દિવસ-૨ ૦૩-૧૦-૨૦૧૮ | દિવસ-૩ ૦૪-૧૦-૨૦૧૮ | દિવસ-૪ ૦૫-૧૦-૨૦૧૮ | દિવસ-૫ ૦૬-૧૦-૨૦૧૮ |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| વરસાદ (મી.મી) | ૦૦ | ૦૦ | ૦૦ | ૦૦ | ૦૦ |
| મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે) | ૩૭ | ૩૭ | ૩૬ | ૩૬ | ૩૭ |
| લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે) | ૨૪ | ૨૪ | ૨૩ | ૨૪ | ૨૪ |
| વાદળની સ્થિતિ | મોટેભાગે ચોખ્યું | ચોખ્યું | મોટેભાગે ચોખ્યું | ચોખ્યું | મોટેભાગે ચોખ્યું |
| સવારના ભેજના ટકા | ૫૪ | ૫૩ | ૫૨ | ૫૧ | ૫૩ |
| બપોર બાદ ભેજના ટકા | ૩૫ | ૩૭ | ૩૮ | ૩૫ | ૩૮ |
| પવનની ગતિ (કિમી/કલાક) | ૦૧૧ | ૦૧૧ | ૦૧૧ | ૦૧૧ | ૦૦૯ |
| પવનની દિશા (ડિગ્રી) | ૨૧૫ | ૩૩૫ | ૩૩૭ | ૨૩૫ | ૪૨ |

પોરબંદર

| | | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|---------|---------|------------------|
| વરસાદ (મી.મી) | ૦૦ | ૦૦ | ૦૦ | ૦૦ | ૦૦ |
| મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે) | ૩૭ | ૩૭ | ૩૭ | ૩૬ | ૩૬ |
| લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે) | ૨૨ | ૨૨ | ૨૧ | ૨૧ | ૨૨ |
| વાદળની સ્થિતિ | મોટેભાગે ચોખ્યું | ચોખ્યું | ચોખ્યું | ચોખ્યું | મોટેભાગે ચોખ્યું |
| સવારના ભેજના ટકા | ૭૧ | ૫૩ | ૭૪ | ૫૫ | ૫૬ |
| બપોર બાદ ભેજના ટકા | ૪૪ | ૪૧ | ૪૦ | ૪૧ | ૪૧ |
| પવનની ગતિ (કિમી/કલાક) | ૦૧૧ | ૦૧૦ | ૦૧૦ | ૦૧૧ | ૦૦૯ |
| પવનની દિશા (ડિગ્રી) | ૩૪૪ | ૩૩૧ | ૩૩૪ | ૩૪૨ | ૪૮ |

દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાક્ય વિભાગ

| પાકનું નામ | પાક અવસ્થા | રોગ / જીવાત / જાત | કુષિ સલાહ |
|---------------|------------|----------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ➢ જુલાઓમાં આવતા પાંચ દિવસોમાં વરસાદ ની કોઈ શક્યતાઓ રહેલી નથી. ➢ વરસાદની ખેંચ જણાય તો જમીનની પ્રતને ધ્યાને લઈ ચોમાસું પાકને પીયત આપવું. (સુયા બે સવા, કૂલ અવસ્થા, જીડવા અવસ્થા, ડોડવા બંધાવા વગેરે અને તેના વિકાસની અવસ્થાએ પાણીની ખેંચ જણાય તો અવશ્ય પીયત આપવું.) |

| | | | |
|--------------------------|---|--|---|
| ચોમાસું મગફળી | સુયા / ડોડવા અવસ્થા / દેહધાર્મિક પરિપક્વતા | ઉગસુક રોગ / ચુસીયા જીવાત / લીલી ઈયળ / ઘેણ | <ul style="list-style-type: none"> ❖ જો વરસાદની અછત હોય તો મગફળી પાકમાં સુયા બેસવા અને ડોડવા બંધાવા વખતે અવશ્ય પિયત આપવું. ❖ મગફળીના ઘૈણના નિયંત્રણ જમીનમાં પુરતો ભેજ હોય ત્યારે ફોરેટ ૧૦ જી ૨૫ કીગ્રા.હે. અથવા કલોરોપાયરીઝોસ હેકટરે ૪ લીટર પીયત સાથે આપવી અથવા પીયતની સગવડ ન હોય તો નોઝલ કાઢી ૧૦ લીટર પાણીમાં ૨૫ મીલી દવા ભેજવી મગફળીના મુળ પાસે પડે અને જમીનમાં ઉત્તરે તે રીતે રેડવાથી નિયંત્રણ મળે છે. ❖ મગફળીના પાકમાં થીપ્સ અને લીલા તડતડીયાના નિયંત્રણ માટે ૩.૦ મીલી ફોસ્ફામીડોન અથવા ૧૫ મીલી ડાયમીથીએટ અથવા ૧૫ મીલી મીથાઇલ-ઓ-ડેમેટોન દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેજવી છંટકાવ કરવો. ❖ મગફળીનો પાક પરીપક્વ થાય એટલે પીયત બંધ કરવું. ડોડવા પરીપક્વ થયે પીયત આપવાથી મગફળીનો ઉગાવો થવાથી ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા ઘટે છે અને સમયસર કાપણી કરવી. |
| કપાસ | ફૂલ / જીડવા અવસ્થા | ચુસીયા જીવાત / ગુલાબી ઈયળ | <ul style="list-style-type: none"> ❖ કપાસના પાકમાં થીપ્સ અને લીલા તડતડીયાના નિયંત્રણ માટે ૩.૦ મીલી ફોસ્ફામીડોન અથવા ૧૫ મીલી ડાયમીથીએટ અથવા ૧૫ મીલી મીથાઇલ-ઓ-ડેમેટોન દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેજવી છંટકાવ કરવો. ❖ કપાસનો પાક ત્રણ માસનો થાય ત્યારે પુર્તી ખાતરનો હપ્તો હેકટરે ૧૬૬.૬ કી.ગ્રા. ચુરીયા અથવા ૪૦૦ કી.ગ્રા અમોનીયમ સલ્ફેટ આપવું. ❖ કપાસમાં ગુલાબી ઈયળના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા ટ્રાઈઝોઝોસ ૧૦ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેજવી છંટકાવ કરવો તથા એતરમાં ફેરોમેન ટ્રેપ ગોઠવી નર કુદાઓનો નાશ કરવો અથવા ૧૦૦ ગ્રામ બીવેરીયા પાવડર અને ૨૦ મીલી પ્રોફેનોઝોસ ને ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેજવી છંટકાવ કરવો. ❖ પાકને સમયાંતરે પીયત આપવું. |
| સોયાબીન | ફૂલ / શીંગ અવસ્થા | લશકરી ઈયળ | <ul style="list-style-type: none"> ❖ પાકમાં લશકરી ઈયળનો ઉપદ્રવ ખુબ જોવા મળે તો તેના નિયંત્રણ માટે સંકલીત જીવાત નિયંત્રણના પગલા લેવા જેવા કે ફેરોમેન ટ્રેપ, વર્ટીસીલીયમ લોહાટી કુગ વગેરેનો |

| | | | |
|---------|-------------------------|--------------|--|
| | | | <p>ઉપયોગકરવો અથવા ૨૫ મીલી કલોરોપાયરીઝોસ અથવા ૧૦ મીલી મીથોમાઈલ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ પાકને જરૂરીયાત મુજબ પીયત આપવું. |
| તલ | ફૂલ / બયઢાં અવસ્થા | પાન કથીરી | <ul style="list-style-type: none"> ❖ તલના પાકમાં થ્રીપ્સ, નિયંત્રણ માટે અથવા ૧૫ મીલી ડાયમીથોએટ અથવા ૧૫ મીલી મીથાઈલ-ઓ-ડેમેટોન દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. |
| એરંડા | વૃધ્ઘી | ચુસીયા જીવાત | <ul style="list-style-type: none"> ❖ એરંડાના પાકમાં થ્રીપ્સ, સફેદ માખી અને લીલા તડતડીયાના નિયંત્રણ માટે ૩૦ મીલી ટ્રાઇઝોઝોસ અથવા ૩.૦ મીલી ફ્રેસ્કામીડોન અથવા ૧૫ મીલી ડાયમીથોએટ અથવા ૧૫ મીલી મીથાઈલ-ઓ-ડેમેટોન દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ એરંડામાં ઘોડીયા ઈયળના નિયંત્રણ માટે ૨૦ મીલી કલીનાલ્ઝોસ (૧.૫ % બુકી) અથવા ૪૦ ગ્રામ કાર્બારીલ ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ પાકને સમયાંતરે પીયત આપવું. |
| તુવેર | વૃધ્ઘી / ફૂલ અવસ્થા | કથીરી | <ul style="list-style-type: none"> ❖ તુવેરમા સ્ટરીલીટી મોઝેક (વંધ્યત્વનો રોગ, કથીરી)ના નિયંત્રણ માટે ડાયકોઝોલ ૧૫ મીલી ૧૦ લી. પાણીમા ભેળવી ૩૫, ૬૫, અને ૮૫ દિવસે છંટકાવ કરવો. ❖ પાકને સમયાંતરે પીયત આપવું. |
| મગ | દેહધાર્મિક પરિપક્વતા | - | <ul style="list-style-type: none"> ❖ મગના પાકની દેહધાર્મિક પરિપક્વતા એ શીંગોની વીણી કરવી અને પાકની કાપણી કરવી. |
| અડન | દેહધાર્મિક પરિપક્વતા | - | <ul style="list-style-type: none"> ❖ અડનના પાકની દેહધાર્મિક પરિપક્વતા એ શીંગોની વીણી કરવી અને પાકની કાપણી કરવી. |
| શાકભાજુ | વૃધ્ઘી/કુલ/ ફળ | - | <ul style="list-style-type: none"> ❖ વેલાવાળા શાકભાજુના પાકમાં પાન કોરીયાનો ઉપદ્રવ ટાળવા માટે મુખ્ય પાકની ફરતે દિવેલા તથા ગલગોટાનુ વાવેતર કરવાથી તેનુ નિયંત્રણ કરી શકાય છે જો ઉપદ્રવ વધુ જોવા મળે તો ૧૦ મીલી મીથાઈલ ઓ ડેમેટોન (૨૫ ઈસી) અથવા ૧૦ મીલી ડાયમીથોએટ (૩૦ ઈસી) ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો ત્યાર બાદ પણીથી બીજો છંટકાવ ૧૫ દિવસ પછી કરવો. ❖ શાકભાજુના પાકમાં ચુસીયા પ્રકારની જીવાતના નિયંત્રણ માટે લીબોળીનુ તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીનુ મીજનુ |

| | | |
|---------|---|---|
| | | <p>૫ ટકા એકનું દ્રાવણ ૫૦૦મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં ભેજવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો એસીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦લી. અથવા દ્રાયઝોફ્સ ૪૦ ટકા ૨૦ મીલી/૧૦ લી.પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ મરચીના પાકમાં થ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે ૨૦મીલી પ્રોફેનોફોસ અને લિષ્ટોળીનું તેલ ૫૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણી મિશ્રણ કરી છાંટવી. ❖ શાકભાજુનાપાકની રોપણી બાદ ચુસીયા પ્રકારની જીવાતના નિયંત્રણ માટે દાણાદાર ફોરેટ ૧૦ જી છોડ દીઠ ૨ ગ્રામ મુજબ આપીને પીયત આપવું. ❖ મરચીના પાકમાં વાઈરસના કારણે પીળા થઈ કુકડાઈ ગયેલ છોડ ઉપાડી જમીનમાં દાટી નાશ કરવો અને ૫ મીલી ઈમીડાકલોપ્રાઇડ ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેજવી છંટકાવ કરવો. ❖ રીંગણ અને ટમેટાના ફળ અને અને ડોકાની ઈયણોનો ઉપદ્રવ જણાયતો તોનુકશાન પામેલ ફળ અને ડોકાને તોડીને જમીનમાં દાટી દેવા અને રીનાક્ષીપાયર દવા ૩મીલીદવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેજવી છંટકાવ કરવો. ❖ રીંગણ અને ટમેટાના પાકમા ફળમાખીના નિયંત્રણ માટે એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેજવી છંટકાવ કરવો. ❖ શાકભાજુ ને સમયસર ઉતારી ગ્રેડિંગ કરી બજારમાં મુકવા. |
| પશુપાલન | - | <ul style="list-style-type: none"> ❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો અને પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્ખા રાખવા. ❖ માખી મચ્છરથી રક્ષણ માટે ફીનાઈલ છાટવું. ❖ પશુઓને યોગ્ય આહારમાંખનિજયુક્ત મિશ્રણ સાથે સંગ્રહિત ચારા આપો. ચારા ને સલામત સ્થળો સંગ્રહિત કરવો જોઈએ. ❖ ચારા માટે ચાફ કટર વાપરો. ❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથીન અથવા એમીટાજ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી. ❖ દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીક ઓક્સાઈડ અથલા બોરીક પાવડરથી બરાબર સાફ કરવા. |

JUNAGADH

Phone: 0285-2670139

Date: - 01-10-2018

Significant weather for the preceding week

| | |
|--------------------------|-------------|
| Rain fall (mm) | 000.0 |
| Maximum temperature °C | 35.6 – 37.0 |
| Minimum temperature °C | 20.9 – 25.3 |
| RH % (Morning/Afternoon) | 68 – 28 |
| Wind speed (Kmph) | 02.7 – 03.0 |
| Cloud cover | 0 |

(Period from 02 to 06 October 2018)

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 06-10-2018

| Parameters | Day-1 02-10-18 | Day-2 03-10-18 | Day-3 04-10-18 | Day-4 05-10-18 | Day-5 06-10-18 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rain fall (mm) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Maximum temperature °C | 37 | 37 | 36 | 36 | 37 |
| Minimum temperature °C | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| Cloud cover (Okta) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| RH I % (Morning) | 64 | 63 | 62 | 61 | 63 |
| RH II % (After noon) | 35 | 37 | 38 | 35 | 38 |
| Wind speed (Km/h) | 011 | 011 | 011 | 011 | 009 |
| Wind direction(Deg) | 215 | 335 | 337 | 235 | 42 |

Agro meteorological Advisories

| | | |
|----------------|-------------|--|
| General Advice | Rain fall | There is forecasting of no rainfall during next five days. |
| | Temperature | Maximum and minimum temperature likely to be in range of 37 - 36 °C and 23 - 24°C, |

| | RH (%) Wind Direction and Wind Speed | respectively. The Relative Humidity is likely to be in the range of 64 – 35 %. Direction and speed of wind is likely to SW, NW and NE and 09 - 11 km/h, respectively. | |
|-----------------------------|---|---|--|
| Crop | Variety/ Pest/Insect | Stage | Agro met Advisories |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ Forecasting of no rainfall during next five days. ○ Apply irrigation to the crop at different growth stage due to the shortage of rainfall. |
| Kharif Groundnut | Stem rot / Sucking pest | Pegging stage / Pod development | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Under shortage of rainfall condition groundnut should be irrigated during pegging stage without fail. ➤ For the control of rust and tikka, spray fungicides mencozeb 26 gm mix in 10 litre of water at after sowing of 35 days. ➤ For the control of white grub, soil application of phorate 25 kg/ha OR 4 liter/ha choloropayriphos apply with irrigation OR Drenching of 25 ml choloropayriphos in 10 liter of water near the base of the plant. ➤ For the control of Thrips and Jassid in groundnut, spray 3 ml phosphamidon OR 15 ml dimethoate OR 15 ml methyl-O-demeton mix in 10 liter of water. ➤ Postponed the irrigation at the time of maturity. If irrigation is applied at the time of pod maturity, yield is reduced and also affect the quality of pod. |
| Cotton | Sucking pest | Flowering / Bud initiation | <ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of Thrips and Jassid, spray 3 ml phosphamidon OR 15 ml dimethoate OR 15 ml methyl-O-demeton mix in 10 liter of water. |

| | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ When the cotton crop is three months, apply the supplementary fertilizer dose is 166.6 Urea kg/ha or 400 kg/ha Ammonium sulphate. ➤ For the control of pink bollworm, spray 10 ml deltamethrin OR trizophos in 10 litre of water. Install pink bollworm pheromone traps and remove and destroy crop residues. OR spray 100 gm Beauveria bassiana powder and 20 ml prophenophos mix in 10 liter of water. ➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. |
| Soyabean | Prodenia | Flowering / Podding | <ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of prodenia, Use of integrated pest management like a pheromone trap, <i>verticillium locati</i> fungi etc. OR spray 25 ml chloropyariphos OR 10 ml methomile OR 5 ml DDVP in 10 litre of water. ➤ Apply irrigation to the crop at critical stage. |
| Seasame | Mite | Flowering / Capsule formation | <ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of Thrips, spray 15 ml dimethoate OR 15 ml methyl-O-demeton mix in 10 liter of water. |
| Castor | Sucking pest | Vegetative growth | <ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of Thrips, white fly and Jassid, spray 30 ml Trizophos OR 3 ml phosphamidon OR 15 ml dimethoate OR 15 ml methyl-O-demeton mix in 10 liter of water. ➤ For the control of castor semi looper, spray 20 ml quinalphos (1.5 % powder) OR 40 gm carbaryl in 10 liter of water. ➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. |
| Pigeon pea | Mite | Flowering | <ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of mite, spray Diacofol 15 ml in 10 liter of water at 35, 65 and 95 days after sowing. ➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. |
| Green gram | Sucking | Maturity | <ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of pod borer, spray |

| | | | |
|------------------------|---------------------|--|---|
| | pest | | <p>diaclorovos 5 ml OR quinalphos 20 ml OR endoxacarb 5 ml OR profenophos 20 ml in 10 litre of water at flowering stage.</p> <p>➤ Harvesting operation should be carried out at maturity stage.</p> |
| Black gram | Sucking pest | Maturity | <p>➤ For the control of pod borer, spray diaclorovos 5 ml OR quinalphos 20 ml OR endoxacarb 5 ml OR profenophos 20 ml in 10 litre of water at flowering stage.</p> <p>➤ Harvesting operation should be carried out at maturity stage.</p> |
| Vegetable crops | - | Sowing/ Flowering/ Fruiting | <p>➤ For the control of leaf webber in fruit leafy vegetable, sowing of trap crop (castor and galgota) around the vegetable crop. For the heavy incidence spray 10 ml methyl O demeton (25 EC) Or 10 ml diamethoate (30 EC) in 10 liter of water.</p> <p>➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 or neem oil 40 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval.</p> <p>➤ For the control of thrips in chilli, spray 20 ml profenophos in 10 litres of water.</p> <p>➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval.</p> <p>➤ Rouging of viral infested crop should be done in chilli. Infected plants should be uprooted and buried in the soil. After rouging, spraying</p> |

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| | | | <p>of 5 mi Imidacloprid per 10 litre of water is advised for control the vector, when sky remains clear.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Apply regular irrigation at 6 to 8 days to the crop at the flowering and fruiting stage. ➤ In brinjal and tomato crops constant monitoring of borers by using pheromone traps 4-6 per acre is advised, for the control of fruit borer, spray reenaxipayar @ 3.0ml in 10 lit of water. ➤ In brinjal and tomato crops, for the control of fruit fly, spray acetemaphrid 5.0 ml in 10 lit of water. ➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading. |
| Livestock | - | - | <ul style="list-style-type: none"> ➤ To provide adequate food and keep the animals clean shed. ➤ Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. ➤ Give stored fodder with mineral mixture. Fodder should be stored at safe place. ➤ Feed silage & hay material along with concentrate feed. ➤ Use chaff cutter for fodder. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water. ➤ Udder of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder. |

PORBANDAR

Phone: 0285-2670139

Date: - 01-10-2018

(Period from 02 to 06 October 2018)

Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 06-10-2018

| Parameters | Day-1 02-10-18 | Day-2 03-10-18 | Day-3 04-10-18 | Day-4 05-10-18 | Day-5 06-10-18 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rain fall (mm) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Maximum temperature °C | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 |
| Minimum temperature °C | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 |
| Cloud cover (Okta) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RH I % (Morning) | 71 | 63 | 74 | 66 | 58 |
| RH II % (After noon) | 44 | 41 | 40 | 41 | 41 |
| Wind speed (Km/h) | 011 | 010 | 010 | 011 | 006 |
| Wind direction(Deg) | 344 | 331 | 334 | 342 | 48 |

Agro meteorological Advisories

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------|---|
| General Advice | Rain fall | There is forecasting of no rainfall during next five days. | | |
| | Temperature | Maximum and minimum temperature likely to be in range of 36 - 37°C and 21 - 22°C, respectively. | | |
| | RH (%) | The Relative Humidity is likely to be in the range of 74 – 40 %. | | |
| | Wind Direction and Wind Speed | Direction and speed of wind is likely to be NW and NE and 06 – 11 km/h, respectively. | | |
| | Crop | Variety/ Pest / Insect | Stage | Agro met Advisories |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Forecasting of no rainfall during next five days. • Apply irrigation to the crop at different growth stage due to the shortage of rainfall. |

| | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| Kharif Groundnut | Stem rot / Sucking pest | Pegging / Pod development / Maturity | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Under shortage of rainfall condition groundnut should be irrigated during pegging stage without fail. ➤ For the control of rust and tikka, spray fungicides mencozeb 26 gm mix in 10 litre of water at after sowing of 35 days. ➤ For the control of white grub, soil application of phorate 25 kg/ha OR 4 liter/ha choloropayriphos apply with irrigation OR Drenching of 25 ml choloropayriphos in 10 liter of water near the base of the plant. ➤ For the control of Thrips and Jassid in groundnut, spray 3 ml phosphamidon OR 15 ml dimethoate OR 15 ml methyl-O-demeton mix in 10 liter of water. ➤ Postponed the irrigation at the time of maturity. If irrigation is applied at the time of pod maturity, yield is reduced and also affect the quality of pod. |
| Cotton | Sucking pest | Flowering / Bud initiation | <ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of Thrips and Jassid, spray 3 ml phosphamidon OR 15 ml dimethoate OR 15 ml methyl-O-demeton mix in 10 liter of water. ➤ When the cotton crop is three months, apply the supplementary fertilizer dose is 166.6 Urea kg/ha or 400 kg/ha Ammonium sulphate. ➤ For the control of pink bollworm, spray 10 ml deltamethrin OR trizophos in 10 litre of water. Install pink bollworm pheromone traps and remove and destroy crop residues. OR spray 100 gm Beauveria bassiana powder and 20 ml |

| | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
| | | | <p>prophenophos mix in 10 liter of water.</p> <p>➤ Apply irrigation to the crop at regular interval.</p> |
| Soyabean | Prodenia | Flowering / Podding | <p>➤ For the control of prodenia, Use of integrated pest management like a pheromone trap, <i>verticillium locati</i> fungi etc. OR spray 25 ml chloropyariphos OR 10 ml methomile OR 5 ml DDVP in 10 litre of water.</p> <p>➤ Apply irrigation to the crop at critical stage.</p> |
| Seasame | Mite | Flowering / Capsule formation | <p>➤ For the control of Thrips, spray 15 ml dimethoate OR 15 ml methyl-O-demeton mix in 10 liter of water.</p> |
| Castor | Sucking pest | Vegetative growth | <p>➤ For the control of Thrips, white fly and Jassid, spray 30 ml Trizophos OR 3 ml phosphamidon OR 15 ml dimethoate OR 15 ml methyl-O-demeton mix in 10 liter of water.</p> <p>➤ For the control of castor semi looper, spray 20 ml quinalphos (1.5 % powder) OR 40 gm carbaryl in 10 liter of water.</p> <p>➤ Apply irrigation to the crop at regular interval.</p> |
| Pigeon pea | Mite | Vegetative growth | <p>➤ For the control of mite, spray Diacofol 15 ml in 10 liter of water at 35, 65 and 95 days after sowing.</p> <p>➤ Apply irrigation to the crop at regular interval.</p> |
| Green gram | - | Maturity | <p>➤ Harvesting operation should be carried out at maturity stage.</p> |
| Black gram | - | Maturity | <p>➤ Harvesting operation should be carried out at maturity stage.</p> |
| Vegetable crops | - | Sowing/ Flowering/ Fruiting | <p>➤ For the control of leaf webber in fruit leafy vegetable, sowing of trap crop (castor and galgota) around the vegetable crop. For the heavy incidence spray 10 ml methyl O</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>demeton (25 EC) Or 10 ml diamethoate (30 EC) in 10 liter of water.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 or neem oil 40 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. ➤ For the control of thrips in chilli, spray 20 ml profenophos in 10 litres of water. ➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. ➤ Rouging of viralinfested crop should be done in chilli. Infected plants should be uprooted and buried in the soil. After rouging, spraying of 5 ml Imidacloprid per 10 litre of water is advised for control the vector, when sky remains clear. ➤ Apply regular irrigation at 6 to 8 days to the crop at the flowering and fruiting stage. ➤ In brinjal and tomato crops constant monitoring of borers by using pheromone traps 4-6 per acre is advised, for the control of fruit borer, spray reenaxipayar @ 3.0ml in 10 lit of water. ➤ In brinjal and tomato crops, for the control of fruit fly, spray acetemaphrid 5.0 ml in 10 lit of water. ➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to |
|--|--|---|

| | | | |
|-----------|---|---|--|
| | | | the market often grading. |
| Livestock | - | - | <ul style="list-style-type: none"> ➤ To provide adequate food and keep the animals clean shed. ➤ Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. ➤ Give stored fodder with mineral mixture. Fodder should be stored at safe place. ➤ Feed silage & hay material along with concentrate feed. ➤ Use chaff cutter for fodder. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitz 2 ml in 1 litre of water. ➤ Udder of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder. |