

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ

તા. ૦૬-૦૨-૨૦૧૯ થી તા. ૧૦-૦૨-૨૦૧૯

(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુ.કૃ.યુ.)

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન : ૨૦૧૮-૧૯

પાછલા અઠવાડીયાનું જુનાગઢનું હવામાન

| હવામાન પરીબળો | દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર કૃષિ આબોહવાકીય વિસ્તાર |
|-----------------------|--|
| વરસાદ (મીમી) | ૦૦૦.૦ |
| મહત્તમ તાપમાન (°સે.) | ૩૩.૬ |
| લઘુતમ તાપમાન (°સે.) | ૧૨.૩ |
| ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ) | ૫૮ - ૨૯ |
| પવનની ગતિ (કિમી/કલાક) | ૦૮.૦ |

પત્રક-બ : જીલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૧૦-૦૨-૨૦૧૯ સુધી)

ભારત સરકારશ્રીના હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલ હવામાન આગાહીની માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા યોજના, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુનાગઢ તરફથી જણાવવામા આવે છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના

૧.જુનાગઢ:- જીલ્લામા આગામી તારીખ ૦૬/૦૨/૨૦૧૯ થી ૧૦/૦૨/૨૦૧૯ દરમ્યાન આકાશ મુખ્યત્વે આગામી પાંચ દિવસોમાં યોખ્ખું થી મોટેભાગે યોખ્ખું રહેશે, આવતા પાંચ દિવસોમાં વરસાદ ની કોઈ શક્યતાઓ રહેલી નથી. પવનની ઝડપ ૧૭ થી ૩૧ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્તમ તાપમાન ૨૭ ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુતમ તાપમાન ૧૭ થી ૧૮ ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

૨.પોરબંદર:- જીલ્લામા આગામી તારીખ ૦૬/૦૨/૨૦૧૯ થી ૧૦/૦૨/૨૦૧૯ દરમ્યાન આકાશ મુખ્યત્વે આગામી પાંચ દિવસોમાં યોખ્ખું થી મોટેભાગે યોખ્ખું રહેશે, આવતા પાંચ દિવસોમાં વરસાદ ની કોઈ શક્યતાઓ રહેલી નથી. પવનની ઝડપ ૧૭ થી ૩૩ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્તમ તાપમાન ૨૮ થી ૩૨ ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુતમ તાપમાન ૧૪ થી ૧૫ ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

જુનાગઢ

| હવામાન પરીબળો / તારીખ | દિવસ-૧ ૦૬-૦૨-૨૦૧૯ | દિવસ-૨ ૦૭-૦૨-૨૦૧૯ | દિવસ-૩ ૦૮-૦૨-૨૦૧૯ | દિવસ-૪ ૦૯-૦૨-૨૦૧૯ | દિવસ-૫ ૧૦-૦૨-૨૦૧૯ |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| વરસાદ (મી.મી) | ૦૦ | ૦૦ | ૦૦ | ૦૦ | ૦૦ |
| મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે) | ૨૮ | ૨૭ | ૨૬ | ૨૬ | ૨૭ |
| લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે) | ૧૮ | ૧૮ | ૧૭ | ૧૭ | ૧૭ |
| વાદળની સ્થિતિ | મોટેભાગે ચોખ્ખું | ચોખ્ખું | ચોખ્ખું | ચોખ્ખું | ચોખ્ખું |
| સવારના ભેજના ટકા | ૬૧ | ૭૦ | ૬૨ | ૫૪ | ૪૫ |
| બપોર બાદ ભેજના ટકા | ૫૧ | ૫૦ | ૪૯ | ૪૨ | ૨૯ |
| પવનની ગતિ (કિમી/કલાક) | ૦૨૦ | ૦૩૧ | ૦૧૭ | ૦૨૩ | ૦૨૫ |
| પવનની દિશા (ડીગ્રી) | ૩૪૧ | ૩૦૬ | ૩૧૫ | ૪ | ૩૦ |

પોરબંદર

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| વરસાદ (મી.મી) | ૦૦ | ૦૦ | ૦૦ | ૦૦ | ૦૦ |
| મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે) | ૩૨ | ૩૦ | ૨૮ | ૨૮ | ૨૯ |
| લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે) | ૧૫ | ૧૫ | ૧૪ | ૧૪ | ૧૪ |
| વાદળની સ્થિતિ | મોટેભાગે ચોખ્ખું | ચોખ્ખું | ચોખ્ખું | ચોખ્ખું | ચોખ્ખું |
| સવારના ભેજના ટકા | ૬૩ | ૭૦ | ૬૨ | ૫૩ | ૪૭ |
| બપોર બાદ ભેજના ટકા | ૪૯ | ૫૩ | ૪૯ | ૪૩ | ૨૯ |
| પવનની ગતિ (કિમી/કલાક) | ૦૨૦ | ૦૩૩ | ૦૧૭ | ૦૨૩ | ૦૨૩ |
| પવનની દિશા (ડીગ્રી) | ૩૪૨ | ૩૦૨ | ૩૦૯ | ૪ | ૩૧ |

દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકિય વિભાગ

| પાકનું નામ | પાક અવસ્થા | રોગ / જીવાત / જાત | કૃષિ સલાહ |
|------------|----------------------------|-------------------|--|
| ઘઉં | નીંઘલ / દુધીયા દાણા અવસ્થા | - | ❖ કુલ અને દાણાની અવસ્થાએ સમયસર પિયત આપવું. |

| | | | |
|---------|----------------------|-----------------------|--|
| ચણા | પોપટા અવસ્થા | લીલી / લશ્કરી ઈંચળ | <ul style="list-style-type: none"> ❖ પાકને સમયાંતરે પીયત આપવું. ❖ ચણાના પાકમાં લીલી અને લશ્કરી ઈંચળના નિયંત્રણ માટે ૬ ગ્રામ એમામેક્ટીન બેન્ઝોયેટ અથવા ૨૦ મીલી ક્વીનાલફોસ ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવાથી સાડું પરીણામ મળે છે. |
| ઘાણા | ફૂલ / દાણા અવસ્થા | ભુકીચારો | <ul style="list-style-type: none"> ❖ પાકને સમયાંતરે પીયત આપવું. ❖ પાવડરી માઇલ્ડ્યુ (એરિસિફે બહુકોણ) એ એક ગંભીર રોગ છે, જે પ્રારંભિક તબક્કે અન્યેક કરેલ જો પાકને બગાડ કરે તો. ૧૦ થી ૧૫ દિવસના અંતરાલ પર કરથાનના વેલેટેબલ સલ્ફર ૦.૨૫% અથવા ૦.૨% ઉકેલની ભલામણ કરવામાં આવે છે. |
| લસણ | વૃદ્ધિ | ઉગસુક | <ul style="list-style-type: none"> ❖ સમયસર વાવેલ લસણના પાકમાં નીંદણની કામગીરી કરવી. ❖ પાકને સમયાંતરે પીયત આપવું. ❖ ઉગસુકનો રોગ સફેદ ફૂગના કારણે હોવાથી ટેબચકોનાઝોલ ૧૦ મીલી દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્રણ કરીને ડ્રેનચીંગ કરવું. |
| એરંડા | પરીપક્વ અવસ્થા | - | <ul style="list-style-type: none"> ❖ દિવેલાના પાકમાં માળો (લુમો) પરીપક્વ થયે કાળજી પુર્વક ઉતારી લેવા. દિવેલાના પાકમાં કાપણી માટે માળ પીડા પડે અને ૭૫ % સુકાય જાય ત્યારે કરવી અને આ રીતે ૩ વખત કાપણી કરી માળ તડકામાં સુકવી ગ્રેસીંગ કરવું જેથી ખરવાનો પ્રશ્ન ન રહે. |
| આંબો | કુલ અવસ્થા | - | <ul style="list-style-type: none"> ❖ આંબામાં મધીયાના નિયંત્રણ માટે ૫૦ % કાર્બારીલ ૪૦ ગ્રામ પાવડર અથવા ૩૬ % ઈ.સી. મોનોકોટોફોસ ૧૦ મીલી દવા ૧૦ લી.પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. |
| શાકભાજી | વૃદ્ધી/કુલ/ ફળ | - | <ul style="list-style-type: none"> ❖ વેલાવાળા શાકભાજીના પાકમાં પાન કોરીયાનો ઉપદ્રવ ટાળવા માટે મુખ્ય પાકની ફરતે દિવેલા તથા ગલગોટાનું વાવેતર કરવાથી તેનું નિયંત્રણ કરી શકાય છે જો ઉપદ્રવ વધુ જોવા મળે તો ૧૦ મીલી મીથાઈલ ઓ ડેમેટોન (૨૫ ઈસી) અથવા ૧૦ મીલી ડાયમીથોએટ (૩૦ ઈસી) ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો ત્યાર બાદ પછીથી બીજો છંટકાવ ૧૫ દિવસ પછી કરવો. ❖ શાકભાજીના પાકમાં ચુસીયા પ્રકારની જીવાતના નિયંત્રણ |

| | | | |
|---------|---|---|--|
| | | | <p>માટે લીબોળીનુ તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીનુ મીજનુ ૫ ટકા અર્કનુ દ્રાવણ ૫૦૦મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો એસીટામપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦લી. અથવા દ્રાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૦ મીલી/ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ મરચીના પાકમાં થ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે ૨૦મીલી પ્રોફેનોફોસ અને લિબોળીનુ તેલ ૫૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણી મિશ્રણ કરી છાંટવી. ❖ શાકભાજીના પાકની રોપણી બાદ ચુસીયા પ્રકારની જીવાતના નિયંત્રણ માટે દાણાદાર ફોરેટ ૧૦ જી ઓડ દીઠ ૨ ગ્રામ મુજબ આપીને પીયત આપવુ. ❖ મરચીના પાકમાં વાઈરસના કારણે પીળા થઈ કુકડાઈ ગયેલ ઓડ ઉપાડી જમીનમાં દાટી નાશ કરવો અને ૫ મીલી ઈમીડાક્લોપ્રાઈડ ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ રીંગણ અને ટમેટાના ફળ અને અને ડોકાની ઈયળોનો ઉપદ્રવ જણાય તો નુકશાન પામેલ ફળ અને ડોકાને તોડીને જમીનમાં દાટી દેવા અને રીનાક્ષીપાયર દવા ૩મીલીદવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ રીંગણ અને ટમેટાના પાકમાં ફળમાખીના નિયંત્રણ માટે એસીટેમપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ શાકભાજી ને સમયસર ઉતારી ગ્રેડીંગ કરી બજારમાં મુકવા. |
| પશુપાલન | - | - | <ul style="list-style-type: none"> ❖ શિયાળા ઋતુમાં અતિશય ઠંડા સીધા પવનથી રક્ષણ માટે પશુઓને શેડમાં બાંધવા અને કંતાન કોથળાનો ઉપયોગ કરવો. ❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો અને પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્ખા રાખવા. ❖ માખી મચ્છરથી રક્ષણ માટે ફીનાઈલ છાટવુ. ❖ પશુઓને યોગ્ય આહારમાં ખનિજયુક્ત મિશ્રણ સાથે સંગ્રહિત ચારા આપો. ચારા ને સલામત સ્થળે સંગ્રહિત કરવો જોઈએ. ❖ ચારા માટે ચાફ કટર વાપરો. ❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા |

એમીટાઝ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી.
❖ દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીંક ઓક્સાઈડ અથવા બોરીક પાવડરથી બરાબર સાફ કરવા.

JUNAGADH

Phone: 0285-2670139

Date: - 05-02-2019

Significant weather for the preceding week

| | |
|--------------------------|-------------|
| Rain fall (mm) | 000.0 |
| Maximum temperature °C | 28.4 – 33.6 |
| Minimum temperature °C | 12.3 – 14.7 |
| RH % (Morning/Afternoon) | 65 – 26 |
| Wind speed (Kmph) | 04.4 – 10.2 |
| Cloud cover | 0 |

(Period from 06 to 10 February 2019)

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 10-02-2019

| Parameters | Day-1 06-02-19 | Day-2 07-02-19 | Day-3 08-02-19 | Day-4 09-02-19 | Day-5 10-02-19 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rain fall (mm) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Maximum temperature °C | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 |
| Minimum temperature °C | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| Cloud cover (Okta) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RH I % (Morning) | 61 | 70 | 62 | 54 | 45 |
| RH II % (After noon) | 51 | 50 | 49 | 42 | 29 |
| Wind speed (Km/h) | 020 | 031 | 017 | 023 | 025 |
| Wind direction(Deg) | 341 | 306 | 315 | 4 | 30 |

Agro meteorological Advisories

| | | |
|---------|-----------|---|
| General | Rain fall | There is forecasting of no rainfall during next |
|---------|-----------|---|

| | | | |
|------------------|---|--------------------------------------|---|
| Advice | Temperature RH (%) Wind Direction and Wind Speed | | <p>five days.</p> <p>Maximum and minimum temperature likely to be in range of 26 - 28°C and 17 – 18 °C, respectively.</p> <p>The Relative Humidity is likely to be in the range of 70 – 29 %.</p> <p>Direction and speed of wind is likely to N, NW and NE and 17 - 31 km/h, respectively.</p> |
| Crop | Variety/ Pest/Insect | Stage | Agro met Advisories |
| Wheat | - | Flowering / Milking stage | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Give irrigation at critical stages to the crop. |
| Chickpea | Prodenia / Heliothis | Podding / Pod development | <ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of Prodenia and Heliothis at ETL, spray 20 ml quinalphos in 10 litre of water. ➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. |
| Coriander | Powdery mildew | Flowering / Fruiting | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. ➤ Powdery mildew (Erysiphe polygoni) is a serious disease, which ruin the crop if allowed unchecked in the initial stage itself. Spraying wettable sulphur 0.25% or 0.2% solution of Karathane twice at 10 to 15 days interval is recommended. |
| Garlic | Stem rot | Vegetative growth | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Carry out weeding operation in timely sown garlic. ➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. ➤ Yellowing of leaves due to stem (clove) rot, |

| | | | |
|------------------------|---|--|---|
| | | | Drenching of Tebuconazole 10 ml/10 litre of water. |
| Castor | - | Capsule maturity | ➤ The matured clusters should be picked in time. |
| Mango | - | Flowering | ➤ For the control of madhiya, spray 50 % WP carbaryl 40 gm OR 36 % EC monocrotophos 10 ml in 10 liter of water. |
| Vegetable crops | - | Sowing/ Flowering/ Fruiting | <ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of leaf webber in fruit leafy vegetable, sowing of trap crop (castor and galgota) around the vegetable crop. For the heavy incidence spray 10 ml methyl O demeton (25 EC) Or 10 ml diamethoate (30 EC) in 10 liter of water. ➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 or neem oil 40 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. ➤ For the control of thrips in chilli, spray 20 ml profenophos in 10 litres of water. ➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. ➤ Rouging of viral infested crop should be done in chilli. Infected plants should be uprooted and buried in the soil. After rouging, spraying of 5 ml Imidacloprid per 10 litre of water is advised for control the vector, when sky remains clear. |

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Apply regular irrigation at 6 to 8 days to the crop at the flowering and fruiting stage. ➤ In brinjal and tomato crops constant monitoring of borers by using pheromone traps 4-6 per acre is advised, for the control of fruit borer, spray reenaxipayar @ 3.0ml in 10 lit of water. ➤ In brinjal and tomato crops, for the control of fruit fly, spray acetemapid 5.0 ml in 10 lit of water. ➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading. |
| Livestock | - | - | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Protection of animal due to the cold winter season cattle transfer to the shed. ➤ To provide adequate food and keep the animals clean shed. ➤ Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. ➤ Give stored fodder with mineral mixture. Fodder should be stored at safe place. ➤ Feed silage & hay material along with concentrate feed. ➤ Use chaff cutter for fodder. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water. ➤ Udder of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder. |

PORBANDAR

Phone: 0285-2670139

Date: - 05-02-2019

(Period from 06 to 10 February 2019)

Weather forecast for **Porbandar** Dist. until 08:30 hrs of 10-02-2019

| Parameters | Day-1 06-02-19 | Day-2 07-02-19 | Day-3 08-02-19 | Day-4 09-02-19 | Day-5 10-02-19 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rain fall (mm) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Maximum temperature °C | 32 | 30 | 28 | 28 | 29 |
| Minimum temperature °C | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Cloud cover (Okta) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RH I % (Morning) | 63 | 70 | 62 | 53 | 47 |
| RH II % (After noon) | 49 | 53 | 49 | 43 | 29 |
| Wind speed (Km/h) | 020 | 033 | 017 | 023 | 023 |
| Wind direction(Deg) | 342 | 302 | 309 | 4 | 31 |

Agro meteorological Advisories

| | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|--|
| General Advice | Rain fall Temperature RH (%) Wind Direction and Wind Speed | | <p>There is forecasting of no rainfall during next five days.</p> <p>Maximum and minimum temperature likely to be in range of 28 - 32°C and 14 - 15°C, respectively.</p> <p>The Relative Humidity is likely to be in the range of 70 – 29 %.</p> <p>Direction and speed of wind is likely to be N, NW and NE and 17 – 33 km/h, respectively.</p> |
| Crop | Variety/ Pest / Insect | Stage | Agro met Advisories |
| Wheat | - | Flowering / Milking stage | ➤ Give irrigation at critical stages to the crop. |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--|--|
| Chickpea | Prodenia / Heliothis | Podding / Pod development | <ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of Prodenia and Heliothis at ETL, spray 20 ml quinalphos in 10 litre of water. ➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. |
| Coriander | Powdery mildew | Flowering / Fruiting | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. ➤ Powdery mildew (Erysiphe polygoni) is a serious disease, which ruin the crop if allowed unchecked in the initial stage itself. Spraying wettable sulphur 0.25% or 0.2% solution of Karathane twice at 10 to 15 days interval is recommended. |
| Garlic | Stem rot | Vegetative growth | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Carry out weeding operation in timely sown garlic. ➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. ➤ Yellowing of leaves due to stem (clove) rot, Drenching of Tebuconazole 10 ml/10 litre of water. |
| Castor | - | Capsule maturity | <ul style="list-style-type: none"> ➤ The matured clusters should be picked in time. |
| Mango | - | Flowering | <ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of madhiya, spray 50 % WP carbaryl 40 gm OR 36 % EC monocrotophos 10 ml in 10 liter of water. |
| Vegetable crops | - | Sowing/ Flowering/ Fruiting | <ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of leaf webber in fruit leafy vegetable, sowing of trap crop (castor and galgota) around the vegetable crop. For the heavy incidence spray 10 ml methyl O demeton (25 EC) Or 10 ml diamethoate (30 EC) in 10 liter of water. ➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 or neem oil 40 ml and acetamiprid 20 % SP@ |

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| | | | <p>5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of thrips in chilli, spray 20 ml profenophos in 10 litres of water. ➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP @ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. ➤ Rouging of viral infested crop should be done in chilli. Infected plants should be uprooted and buried in the soil. After rouging, spraying of 5 ml Imidacloprid per 10 litre of water is advised for control of the vector, when sky remains clear. ➤ Apply regular irrigation at 6 to 8 days to the crop at the flowering and fruiting stage. ➤ In brinjal and tomato crops constant monitoring of borers by using pheromone traps 4-6 per acre is advised, for the control of fruit borer, spray renoxipayar @ 3.0ml in 10 lit of water. ➤ In brinjal and tomato crops, for the control of fruit fly, spray acetamiprid 5.0 ml in 10 lit of water. ➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading. |
| Livestock | - | - | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Protection of animal due to the cold winter season cattle transfer to the shed. ➤ To provide adequate food and keep the animals clean shed. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">➤ Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes.➤ Give stored fodder with mineral mixture. Fodder should be stored at safe place.➤ Feed silage & hay material along with concentrate feed.➤ Use chaff cutter for fodder.➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.➤ Udder of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder. |
|--|--|--|---|