

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન  
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ  
તા. ૨૨-૦૭-૨૦૧૫ થી તા. ૨૬-૦૭-૨૦૧૫

(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુ.કૃ.યુ.)

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન : ૨૦૧૫

પાછલા અઠવાડીયાનું જુનાગઢનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર કૃષિ આબોહવાકીય વિસ્તાર
વરસાદ (મીમી)	04.2
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગે.)	34.0
લઘુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	26.7
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	86-71
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	11.4

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી ( તા.૨૬-૦૭-૧૫ સુધી )

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૨૨.૦૭.૧૫	20	10
	૨૩.૦૭.૧૫	50	50
	૨૪.૦૭.૧૫	30	20
	૨૫.૦૭.૧૫	10	10
	૨૬.૦૭.૧૫	10	10
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૨.૦૭.૧૫	30	32
	૨૩.૦૭.૧૫	29	30
	૨૪.૦૭.૧૫	29	30
	૨૫.૦૭.૧૫	29	31
	૨૬.૦૭.૧૫	29	31
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૨.૦૭.૧૫	26	26
	૨૩.૦૭.૧૫	26	26
	૨૪.૦૭.૧૫	26	26
	૨૫.૦૭.૧૫	26	26
	૨૬.૦૭.૧૫	26	26
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૨૨.૦૭.૧૫	મોટેભાગે વાદળછાયુ	મોટેભાગે વાદળછાયુ
	૨૩.૦૭.૧૫	વાદળછાયુ	વાદળછાયુ
	૨૪.૦૭.૧૫	વાદળછાયુ	વાદળછાયુ
	૨૫.૦૭.૧૫	વાદળછાયુ	વાદળછાયુ
	૨૬.૦૭.૧૫	વાદળછાયુ	વાદળછાયુ
મહત્તમ ભેજ (%)	૨૨.૦૭.૧૫	84	85
	૨૩.૦૭.૧૫	85	85
	૨૪.૦૭.૧૫	83	84
	૨૫.૦૭.૧૫	82	83
	૨૬.૦૭.૧૫	82	82
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૨૨.૦૭.૧૫	80	79
	૨૩.૦૭.૧૫	80	82
	૨૪.૦૭.૧૫	79	80
	૨૫.૦૭.૧૫	76	77
	૨૬.૦૭.૧૫	75	74
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૨૨.૦૭.૧૫	027	028
	૨૩.૦૭.૧૫	028	025
	૨૪.૦૭.૧૫	028	028
	૨૫.૦૭.૧૫	022	020
	૨૬.૦૭.૧૫	033	032
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૨૨.૦૭.૧૫	266	267
	૨૩.૦૭.૧૫	260	260
	૨૪.૦૭.૧૫	234	230
	૨૫.૦૭.૧૫	247	256
	૨૬.૦૭.૧૫	252	252

## દક્ષિણ ખેત આબોહવાકિય વિસ્તાર (જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ)

પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
મગફળી	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ અગામી પાચ દિવસ દરમ્યાન હળવા થી મધ્યમ વરસાદ પડવાની આગાહી હોય વરાપ થયે રાસાયણિક દવાનો છંટકાવ ભલામણ મુજબ કરવો.</li> <li>❖ ટ્રાયકોડર્મા વીરીડી (ફુગ) યુક્ત પાવડર વાવ્યા પછી ૩૦ દિવસે ૨.૫ કિલો હેક્ટરે પાણી સાથે ઓગાળી આપવો અથવા ૨.૫ કિલો પાવડર ખોળ અથવા છાણીયા ખાતર સાથે મીક્ષ કરી ચાસમાં આપવો.</li> <li>❖ વરાપના સમયે પાકમાં આંતરખેડ અને નિદાંમણની કામગીરી કરવી.</li> </ul>
કપાસ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ વરાપના સમયે પાકમાં આંતરખેડ અને નિદાંમણની કામગીરી કરવી.</li> <li>❖ અગામી પાચ દિવસ દરમ્યાન હળવા થી મધ્યમ વરસાદ પડવાની આગાહી હોય વરાપ થયે રાસાયણિક દવાનો છંટકાવ ભલામણ મુજબ કરવો</li> </ul>
તુવેર	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ વરાપના સમયે પાકમાં આંતરખેડ અને નિદાંમણની કામગીરી કરવી.</li> </ul>
સોયાબીન	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ વરાપના સમયે પાકમાં આંતરખેડ અને નિદાંમણની કામગીરી કરવી.</li> </ul>
રીંગણા	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ યુસીયા પ્રકારની જાવાતના નિયંત્રણ માટે લીબોળીનુ તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીનુ મીજનુ ૫ ટકા અર્કનુ દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો એસીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો</li> </ul>
ભીંડો	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકમાં યુસીયા ના નિયંત્રણ માટે એસીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ અને લીબોળીનુ તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીનુ મીજનુ ૫ ટકા અર્કનુ દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો દ્રાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૦ મીલી/ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો</li> </ul>
પશુ પાલન	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો.</li> <li>❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાઝ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી.</li> <li>❖ પશુમા ફુટ અને માઉથ રોગના આવે તે માટે જરૂરી રશીકરણ કરાવવુ.</li> <li>❖ પશુઓને વરસાદના સમયે ખુલ્લામા, ઝાડ નીચેકે ઈલેક્ટ્રીક પોલ પાસે ન રાખતા શેડમાં બાંધવાની વ્યવસ્થા કરવી.</li> </ul>

## JUNAGADH

Phone: 0285-2670139

Date:- 21-07-2015

(Period from 22 to 26 July -2015)

### Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	04.2
Maximum temperature °C	33.8-34.2
Minimum temperature °C	26.0-27.2
RH % (Morning/Afternoon)	86-71
Wind speed (Kmph)	9.6-13.5
Cloud cover	6-8

### Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 26-07-2015

Parameters	Day-1 22-07-15	Day-2 23-07-15	Day-3 24-07-15	Day-4 25-07-15	Day-5 26-07-15
Rain fall (mm)	20	50	30	10	10
Maximum temperature °C	30	29	29	29	29
Minimum temperature °C	26	26	26	26	26
Cloud cover (Okta)	7	8	8	8	8
RH % (Morning/After noon)	84-80	85-80	83-79	82-76	82-75
Wind speed (Kmph)	027	028	028	022	033
Wind direction(Deg)	266	260	234	247	252

### Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Insect/Pest/ Variety	Agromet Advisories
<b>Groundnut</b>	<b>Flowering</b>	<b>GG-20, GG-11</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ There is forecasting of light to moderate rainfall during next five days.</li> <li>➤ Interculturing and hand weeding should be carried out after vaspera condition.</li> <li>➤ Mix the <i>Trichoderma viridi</i> powder 2.5 kg/ha + 250kg castor cake and apply when there is sufficient moisture in the soil.</li> </ul>
<b>Cotton</b>	<b>Growth</b>	<b>Bg-II GCH-6, 8, Mallika, Agit, Vikram-5, Uttam, etc...</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspera condition.</li> <li>➤ There is forecasting of light to moderate rainfall during next five days.</li> </ul>
<b>Soybean</b>	<b>Growth</b>	<b>Gujarat Soybean-1,2,3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspera condition.</li> </ul>
<b>Pigeon pea</b>	<b>Growth</b>	<b>BDN-2, GTH-1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspera condition.</li> <li>➤</li> </ul>

<b>Brinjala</b>	<b>Flowerin/ fruiting</b>	<b>Thrips and White Fly</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 ml in 10 litre of water at 15 days interval (4 spray).</li> </ul>
<b>Lady's finger</b>	<b>Flowerin/ fruiting</b>	<b>Shoot and fruit borer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval.</li> <li>➤ Collect damaged fruits and buried deep in soil.</li> </ul>
<b>Livestock</b>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other diseases.</li> <li>➤ Do not keep the animals in open during rainy weather condition.</li> <li>➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.</li> </ul>

## PORBANDAR

Phone : 0285-2670139

Date :21-07-2015

(Period from 22 to 26 July -2015)

**Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 26-07-2015**

Parameters	Day-1 22-07-15	Day-2 23-07-15	Day-3 24-07-15	Day-4 25-07-15	Day-5 26-07-15
Rain fall (mm)	10	50	20	10	10
Maximum temperature °C	32	30	32	31	31
Minimum temperature °C	26	26	26	26	26
Cloud cover (Okta)	7	8	8	8	8
RH % (Morning/After noon)	85-79	85-82	84-80	83-77	82-74
Wind speed (Kmph)	028	025	028	020	032
Wind direction(Deg)	267	260	230	256	252

### Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Insect/Pest/ Variety	Agromet Advisories
<b>Groundnut</b>	<b>Flowering</b>	<b>GG-20, GG-11</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ There is forecasting of light to moderate rainfall during next five days.</li> <li>➤ Interculturing and hand weeding should be carried out after vaspera condition.</li> <li>➤ Mix the <i>Trichoderma viridi</i> powder 2.5 kg/ha + 250kg castor cake and apply when there is sufficient moisture in the soil.</li> </ul>
<b>Cotton</b>	<b>Growth</b>	<b>Bg-II GCH-6, 8, Mallika, Agit, Vikram-5, Uttam, etc...</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspera condition.</li> <li>➤ There is forecasting of light to moderate rainfall during next five days.</li> </ul>
<b>Soybean</b>	<b>Growth</b>	<b>Gujarat Soybean-1,2,3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspera condition.</li> </ul>
<b>Pigeon pea</b>	<b>Growth</b>	<b>BDN-2, GTH-1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspera condition.</li> <li>➤</li> </ul>
<b>Brinjal</b>	<b>Flowering/ fruiting</b>	<b>Thrips and White Fly</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 ml in 10 litre of water at 15 days interval (4 spray).</li> </ul>
<b>Lady's finger</b>	<b>Flowering/ fruiting</b>	<b>Shoot and fruit borer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval.</li> <li>➤ Collect damaged fruits and buried deep in</li> </ul>

			soil.
<b>Livestock</b>	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other diseases.</li><li>➤ Do not keep the animals in open during rainy weather condition.</li><li>➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.</li></ul>