

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન  
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ  
તા. ૨૯-૦૭-૨૦૧૫ થી તા. ૦૨-૦૮-૨૦૧૫

(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સીટી, જુ.કૃ.યુ.)

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન : ૨૦૧૫

પાછલા અઠવાડીયાનું જુનાગઢનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર કૃષિ આબોહવાકીય વિસ્તાર
વરસાદ (મીમી)	210.3
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગે.)	29.5
લઘુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	24.7
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	96-94
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	5.1

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી ( તા.૦૨-૦૮-૧૫ સુધી )

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૨૯.૦૭.૧૫	110	100
	૩૦.૦૭.૧૫	70	80
	૩૧.૦૭.૧૫	60	50
	૦૧.૦૮.૧૫	40	40
	૦૨.૦૮.૧૫	20	20
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૯.૦૭.૧૫	28	29
	૩૦.૦૭.૧૫	29	29
	૩૧.૦૭.૧૫	29	29
	૦૧.૦૮.૧૫	29	29
	૦૨.૦૮.૧૫	29	29
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૯.૦૭.૧૫	25	25
	૩૦.૦૭.૧૫	25	25
	૩૧.૦૭.૧૫	26	26
	૦૧.૦૮.૧૫	26	26
	૦૨.૦૮.૧૫	27	27
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૨૯.૦૭.૧૫	વાદળછાયુ	વાદળછાયુ
	૩૦.૦૭.૧૫	વાદળછાયુ	વાદળછાયુ
	૩૧.૦૭.૧૫	વાદળછાયુ	વાદળછાયુ
	૦૧.૦૮.૧૫	વાદળછાયુ	વાદળછાયુ
	૦૨.૦૮.૧૫	વાદળછાયુ	વાદળછાયુ
મહત્તમ ભેજ (%)	૨૯.૦૭.૧૫	82	82
	૩૦.૦૭.૧૫	81	82
	૩૧.૦૭.૧૫	81	82
	૦૧.૦૮.૧૫	81	81
	૦૨.૦૮.૧૫	82	82
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૨૯.૦૭.૧૫	78	79
	૩૦.૦૭.૧૫	77	79
	૩૧.૦૭.૧૫	79	79
	૦૧.૦૮.૧૫	76	77
	૦૨.૦૮.૧૫	78	78
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૨૯.૦૭.૧૫	050	049
	૩૦.૦૭.૧૫	044	043
	૩૧.૦૭.૧૫	042	041
	૦૧.૦૮.૧૫	039	037
	૦૨.૦૮.૧૫	038	037
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૨૯.૦૭.૧૫	257	049
	૩૦.૦૭.૧૫	252	043
	૩૧.૦૭.૧૫	246	041
	૦૧.૦૮.૧૫	247	037
	૦૨.૦૮.૧૫	252	037

## દક્ષિણ ખેત આબોહવાકિય વિસ્તાર (જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ)

પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
મગફળી	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ અગામી પાચ દિવસ દરમ્યાન મધ્યમ થી ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી હોય વરાપ થયે રાસાયણિક દવાનો છંટકાવ ભલામણ મુજબ કરવો.</li> <li>❖ ટ્રાયકોડર્મા વીરીડી (ફુગ) યુક્ત પાવડર વાવ્યા પછી ૩૦ દિવસે ૨.૫ કિલો હેક્ટરે પાણી સાથે ઓગાળી આપવો અથવા ૨.૫ કિલો પાવડર ખોળ અથવા છાણીયા ખાતર સાથે મીક્ષ કરી ચાસમાં આપવો.</li> <li>❖ વરાપના સમયે પાકમાં આંતરખેડ અને નિદાંમણની કામગીરી કરવી.</li> <li>❖ ખેતર માથી વધારાના વરસાદ ના પાણીનો નિકાલ કરવો.</li> </ul>
કપાસ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ વરાપના સમયે પાકમાં આંતરખેડ અને નિદાંમણની કામગીરી કરવી.</li> <li>❖ અગામી પાચ દિવસ દરમ્યાન મધ્યમ થી ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી હોય વરાપ થયે રાસાયણિક દવાનો છંટકાવ ભલામણ મુજબ કરવો</li> </ul>
તુવેર	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ વરાપના સમયે પાકમાં આંતરખેડ અને નિદાંમણની કામગીરી કરવી.</li> </ul>
સોયાબીન	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ વરાપના સમયે પાકમાં આંતરખેડ અને નિદાંમણની કામગીરી કરવી.</li> </ul>
રીંગણા	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ યુસીયા પ્રકારની જાવાતના નિયંત્રણ માટે લીબોળીનુ તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીનુ મીજનુ ૫ ટકા અર્કનુ દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો એસીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો</li> </ul>
ભીંડો	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકમાં યુસીયા ના નિયંત્રણ માટે એસીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ અને લીબોળીનુ તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીનુ મીજનુ ૫ ટકા અર્કનુ દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો દ્રાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૦ મીલી/ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો</li> </ul>
પશુ પાલન	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો.</li> <li>❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાઝ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી.</li> <li>❖ પશુમા ફુટ અને માઉથ રોગના આવે તે માટે જરૂરી રશીકરણ કરાવવુ.</li> <li>❖ પશુઓને વરસાદના સમયે ખુલ્લામા, ઝાડ નીચેકે ઈલેક્ટ્રીક પોલ પાસે ન રાખતા શેડમાં બાંધવાની વ્યવસ્થા કરવી.</li> </ul>

## JUNAGADH

Phone: 0285-2670139

Date:- 28-07-2015

(Period from 29 July to 2 August -2015)

### Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	210.3
Maximum temperature °C	29.2-29.8
Minimum temperature °C	23.5-25.5
RH % (Morning/Afternoon)	96-94
Wind speed (Kmph)	4.0-7.4
Cloud cover	8

### Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 02-08-2015

Parameters	Day-1 29-07-15	Day-2 30-07-15	Day-3 31-07-15	Day-4 01-08-15	Day-5 02-08-15
Rain fall (mm)	110	70	60	40	20
Maximum temperature °C	28	29	29	29	29
Minimum temperature °C	25	25	26	26	27
Cloud cover (Okta)	8	8	8	8	8
RH % (Morning/After noon)	82-78	81-77	81-79	81-76	82-78
Wind speed (Kmph)	050	044	042	039	038
Wind direction(Deg)	257	252	246	247	252

## Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Insect/Pest/ Variety	Agromet Advisories
<b>Groundnut</b>	<b>Flowering</b>	<b>GG-20, GG-11</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ There is forecasting of moderate to heavy rainfall during next five days.</li> <li>➤ Interculturing and hand weeding should be carried out after vaspas condition.</li> <li>➤ Mix the <i>Trichoderma viridi</i> powder 2.5 kg/ha + 250kg castor cake and apply when there is sufficient moisture in the soil.</li> <li>➤ Drain out excess rain water from the field.</li> </ul>
<b>Cotton</b>	<b>Growth</b>	<b>Bg-II GCH-6, 8, Mallika, Agit, Vikram-5, Uttam, etc...</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspas condition.</li> <li>➤ There is forecasting of moderate to heavy rainfall during next five days.</li> </ul>
<b>Soybean</b>	<b>Growth</b>	<b>Gujarat Soybean-1,2,3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspas condition.</li> </ul>
<b>Pigeon pea</b>	<b>Growth</b>	<b>BDN-2, GTH-1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspas condition.</li> </ul>
<b>Brinjala</b>	<b>Flowering/ fruiting</b>	<b>Thrips and White Fly</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil</li> </ul>

			50 ml in 10 litre of water at 15 days interval (4 spray).
<b>Lady's finger</b>	<b>Flowering/ fruiting</b>	<b>Shoot and fruit borer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval.</li> <li>➤ Collect damaged fruits and buried deep in soil.</li> </ul>
<b>Livestock</b>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other diseases.</li> <li>➤ Do not keep the animals in open during rainy weather condition.</li> <li>➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.</li> </ul>

## PORBANDAR

Phone : 0285-2670139

Date :28-07-2015

(Period from 29 July to 2 August -2015)

**Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 02-08-2015**

Parameters	Day-1 29-07-15	Day-2 30-07-15	Day-3 31-07-15	Day-4 01-08-15	Day-5 02-08-15
Rain fall (mm)	100	80	50	40	20
Maximum temperature °C	29	29	29	29	29
Minimum temperature °C	25	25	26	26	27
Cloud cover (Okta)	8	8	8	8	8
RH % (Morning/After noon)	82-79	82-79	82-79	81-77	82-78
Wind speed (Kmph)	049	043	041	037	037
Wind direction(Deg)	257	253	245	246	252

### Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Insect/Pest/ Variety	Agromet Advisories
<b>Groundnut</b>	<b>Flowering</b>	<b>GG-20, GG-11</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ There is forecasting of moderate to heavy rainfall during next five days.</li> <li>➤ Interculturing and hand weeding should be carried out after vaspera condition.</li> <li>➤ Mix the <i>Trichoderma viridi</i> powder 2.5 kg/ha + 250kg castor cake and apply when there is sufficient moisture in the soil.</li> <li>➤ Drain out excess rain water from the field.</li> </ul>
<b>Cotton</b>	<b>Growth</b>	<b>Bg-II GCH-6, 8, Mallika, Agit, Vikram-5, Uttam, etc...</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspera condition.</li> <li>➤ There is forecasting of moderate to heavy rainfall during next five days.</li> </ul>
<b>Soybean</b>	<b>Growth</b>	<b>Gujarat Soybean-1,2,3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspera condition.</li> </ul>
<b>Pigeon pea</b>	<b>Growth</b>	<b>BDN-2, GTH-1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspera condition.</li> </ul>
<b>Brinjala</b>	<b>Flowering/ fruiting</b>	<b>Thrips and White Fly</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 ml in 10 litre of water at 15 days interval (4 spray).</li> </ul>
<b>Lady's finger</b>	<b>Flowering/ fruiting</b>	<b>Shoot fruit borer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval.</li> </ul>

			➤ Collect damaged fruits and buried deep in soil.
<b>Livestock</b>	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other diseases.</li><li>➤ Do not keep the animals in open during rainy weather condition.</li><li>➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.</li></ul>