



ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમસેવા  
હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન  
ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેતઆબોહવાકીય વિભાગ  
જુનાગઢ કૃષિ યુનીવર્સિટી, તરઘડિયા-૩૬૦૦૨૩  
મો.નં. ૯૪૨૬૯૩૮૨૩૫  
તા.૦૪-૦૯-૨૦૨૧ થી તા.૦૯-૦૯-૨૦૨૧



(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા, સૂકીખેતી સંશોધન કેન્દ્ર, જી.કૃ.યુ.તરઘડિયા અને ભારત મૌસમ વિભાગ દ્વારા સંપન્ન)  
ગુજરાતના ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓનું કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં. ૪૫/૨૦૨૧

પાછલા અઠવાડિયાનું રાજકોટનું હવામાન

હવામાન પરિબળો	
વરસાદ(મી.મી)	101.6
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	28.9-34.7
લઘુતમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	22.5-24.0
ભેજ (%)સવાર	87-98
ભેજ (%)બપોરબાદ	61-92
પવનનીગતિ (કિમી/કલાક)	3.0-6.4

હવામાન આગાહી :પત્રક-ક

ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેતઆબોહવાકીય વિભાગ-હવામાન આગાહી ૦૮-૦૯-૨૦૨૧ સવારના ૮.૩૦સુધી  
તા.૦૪-૦૯-૨૦૨૧ થી ૦૯-૦૯-૨૦૨૧  
કૃષિસલાહ :

- ભારત સરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા વિભાગ ,જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી ,તરઘડિયા તરફથી જણાવવામાં આવે છે કે ,ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના

રાજકોટ :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૦૪-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૨ ૦૫-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૩ ૦૬-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૪ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૫ ૦૮-૦૯-૨૦૨૧
વરસાદ(મી.મી.)	30	9	1	0	23
મહત્તમ તાપમાન( સે.ગ્રે)	31	31	31	32	32
લઘુતમ તાપમાન( સે.ગ્રે)	25	25	26	26	27
મહત્તમભેજ (%)સવાર	88	87	85	85	86
લઘુતમભેજ (%) બપોરબાદ	64	62	58	58	56
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	18	21	19	16	13
પવનની દિશા(ડીગ્રી)	248	248	248	248	252
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	5	6	5	7	8

- રાજકોટ જીલ્લામાં આગામી તા.૦૪-૦૯-૨૦૨૧ થી તા.૦૮-૦૯-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળછાયું રહેશે અને તા. ૦૪, ૦૫, ૦૬ અને ૦૮ ના રોજ હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૧-૩૨ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૫-૨૭ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૮૫-૮૮ અને ૫૬-૬૪ ટકા રહેશે.
- પવનની દિશા પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૩ થી ૨૧ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

#### મોરબી:

તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૩	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૦૪-૦૯-૨૦૨૧	૦૫-૦૯-૨૦૨૧	૦૬-૦૯-૨૦૨૧	૦૭-૦૯-૨૦૨૧	૦૮-૦૯-૨૦૨૧
વરસાદ(મી.મી.)	26	2	0	0	13
મહત્તમ તાપમાન( સે.ગ્રે)	31	31	31	32	32
લઘુત્તમ તાપમાન( સે.ગ્રે)	25	25	26	26	27
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	85	82	80	78	80
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	55	59	51	51	50
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	21	25	23	19	14
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	249	248	248	248	257
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	6	5	5	7	8

- મોરબી જીલ્લામાં આગામી તા.૦૪-૦૯-૨૦૨૧ થી તા.૦૮-૦૯-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળછાયું રહેશે અને તા. ૦૪, ૦૫ અને ૦૮ ના રોજ હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૧-૩૨ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૫-૨૭ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૭૮-૮૫ અને ૫૦-૫૯ રહેશે.
- પવનની દિશા પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૪ થી ૨૫ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

#### દેવભૂમિદ્વારકા:

તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૩	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૦૪-૦૯-૨૦૨૧	૦૫-૦૯-૨૦૨૧	૦૬-૦૯-૨૦૨૧	૦૭-૦૯-૨૦૨૧	૦૮-૦૯-૨૦૨૧
વરસાદ(મી.મી.)	19	2	1	1	1
મહત્તમ તાપમાન( સે.ગ્રે)	27	27	27	27	28
લઘુત્તમ તાપમાન( સે.ગ્રે)	24	24	24	25	25
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	86	86	83	82	81
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	65	73	65	63	65
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	25	24	22	19	13
પવનનીદિશા (ડીગ્રી)	270	249	248	248	249
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	6	6	4	6	7

- દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લામાં આગામી તા.૦૪-૦૯-૨૦૨૧ થી તા.૦૮-૦૯-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળછાયું રહેશે અને તા. ૦૪ થી ૦૮ ના રોજ હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૨૭-૨૮ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૪-૨૫ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૮૧-૮૬ અને ૬૩-૭૩ રહેશે.
- પવનની દિશા પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૩ થી ૨૫ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

**સુરેન્દ્રનગર :**

તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૩	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૦૪-૦૯-૨૦૨૧	૦૫-૦૯-૨૦૨૧	૦૬-૦૯-૨૦૨૧	૦૭-૦૯-૨૦૨૧	૦૮-૦૯-૨૦૨૧
વરસાદ (મી.મી.)	૩૦	૧૧	૦	૦	૩૧
મહત્તમ તાપમાન ( સે.ગ્રે)	૩૧	૩૧	૩૧	૩૨	૩૨
લઘુત્તમ તાપમાન ( સે.ગ્રે)	૨૫	૨૫	૨૬	૨૬	૨૭
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	૮૫	૮૩	૮૦	૭૮	૮૪
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	૬૦	૫૮	૫૨	૫૨	૫૪
પવનની ગતિ( કિમી/કલાક)	૧૮	૨૧	૨૦	૧૭	૧૨
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૨૪૮	૨૪૮	૨૪૮	૨૪૮	૨૪૮
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	૫	૫	૬	૮	૮

- સુરેન્દ્રનગર જીલ્લામાં આગામી તા.૦૪-૦૯-૨૦૨૧ થી તા.૦૮-૦૯-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળછાયું રહેશે અને તા. ૦૪, ૦૫ અને ૦૮ ના રોજ હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૧-૩૨ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૫-૨૭ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૭૮-૮૫ અને ૫૨-૬૦ રહેશે.
- પવનની દિશા પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૨-૨૧ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.



**અમરેલી :**


તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૩	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૦૪-૦૯-૨૦૨૧	૦૫-૦૯-૨૦૨૧	૦૬-૦૯-૨૦૨૧	૦૭-૦૯-૨૦૨૧	૦૮-૦૯-૨૦૨૧
વરસાદ (મી.મી.)	૨૬	૧૯	૩	૧	૧૧
મહત્તમ તાપમાન ( સે.ગ્રે)	૩૦	૩૦	૩૦	૩૦	૨૯
લઘુત્તમ તાપમાન ( સે.ગ્રે)	૨૫	૨૫	૨૫	૨૬	૨૬
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	૯૨	૯૦	૮૮	૮૭	૮૯
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	૭૦	૬૩	૬૧	૬૨	૬૨
પવનની ગતિ( કિમી/કલાક)	૧૭	૧૮	૧૬	૧૪	૧૨
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૨૪૮	૨૪૯	૨૪૮	૨૪૯	૨૫૭
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	૪	૫	૫	૭	૮

- અમરેલી જીલ્લામાં આગામી તા.૦૪-૦૯-૨૦૨૧ થી તા.૦૮-૦૯-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળછાયું રહેશે અને તા. ૦૪ થી ૦૮ ના રોજ હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૨૯-૩૦ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૫-૨૬ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૮૭-૯૨ અને ૬૧-૭૦ રહેશે.
- પવનની દિશા પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૨ થી ૧૮ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.




**જામનગર :**


તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૩	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૦૪-૦૯-૨૦૨૧	૦૫-૦૯-૨૦૨૧	૦૬-૦૯-૨૦૨૧	૦૭-૦૯-૨૦૨૧	૦૮-૦૯-૨૦૨૧
વરસાદ (મી.મી.)	૨૯	૯	૧	૦	૩
મહત્તમ તાપમાન ( સે.ગ્રે)	૨૮	૨૮	૨૮	૨૮	૨૯
લઘુત્તમ તાપમાન ( સે.ગ્રે)	૨૩	૨૩	૨૩	૨૪	૨૪
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	૮૬	૮૬	૮૪	૮૩	૮૧
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	૬૪	૬૯	૬૩	૬૧	૫૯
પવનની ગતિ( કિમી/કલાક)	૨૩	૨૪	૨૧	૧૮	૧૪

પવનની દિશા (ડીગ્રી)	257	248	248	248	249
વાદળની સ્થિતિ(ઓક્ટા)	6	5	5	7	8
<ul style="list-style-type: none"> <li>જામનગર જીલ્લામાં આગામી તા.૦૪-૦૯-૨૦૨૧ થી તા.૦૮-૦૯-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળછાયું રહેશે અને તા. ૦૪, ૦૫, ૦૬ અને ૦૮ ના રોજ હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની શક્યતા છે.</li> <li>આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૨૮-૨૯ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૩-૨૪ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.</li> <li>આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૮૧-૮૬ અને ૫૯-૬૯ રહેશે.</li> <li>પવનની દિશા પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૪ થી ૨૪ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.</li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>કોરોના વાયરસ ના સંક્રમણને અટકાવવા ખેતી કાર્યો અને ખેત પેદાશના વેચાણ અને બીજ, ખાતર અને દવાઓની ખરીદી દરમ્યાન મોં પર કપડું (માસ્ક) બાંધી રાખવું અને બે વ્યક્તિ વચ્ચે ૬ થી ૭ ફૂટ અંતર જાળવવું.</li> <li>તા. ૦૮ થી ૧૩-સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૧: હવામાન આગોતરો વરતારો : તા.૦૮ થી ૧૩ સપ્ટેમ્બર --૨૦૨૧ દરમ્યાન ગરમ, ભેજવાળું અને મોટાભાગે વાદળછાયું રહેશે અને હળવો થી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.</li> <li>ઉભા પાકમાં યુસીયા જીવાતોનું નિયંત્રણ કરવા ઈમીડાકલોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૪ મી.લી. ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છાંટવી.</li> <li>કપાસ, મરચી અને શાકભાજી પાકોમાં યુરિઆ, એમોનિયમ સલ્ફેટ અને મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર દરેક ૩૦ કી.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટર આપવું અને મિક્સ માયકોન્યુટ્રીયન્ટ ૧૦૦ ગ્રામ/પ્રતિ પંપ છાંટવું.</li> <li>જે વિસ્તારમાં અપૂરતા વરસાદને કારણે આગલો પાક નિષ્ફળ ગયો હોય તો હવે વરસાદ થાય તો અજમા (ગુજરાત-૧ &amp; ૨), તલ ( ગુજરાત-૩ &amp; ૪, પૂર્વા-૧), દિવેલા (જીસીએચ-૪, ૭), ચારાની જુવાર (ગુન્ધી, જીએફસ-૩ , જીએએફસ-૧૧, એસ-૪૯), તુવેર (બીડએન-૨, વૈશાલી), યણા (ઝીન્જરા માટે) જેવા પાકોનું વાવેતર કરી શકાય.</li> <li>હવામાન ચેતવણી: -</li> <li>મોબાઈલ સંદેશ: બી.ટી. કપાસમાં યુરીયા અને એમોનિયમ સલ્ફેટ અને મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ દરેક ૩૦ કી.ગ્રા./હે. પુરતી ખાતર તરીકે આપવું.</li> </ul>					
મુખ્યપાક	પાકઅવસ્થા	રોગ/જીવાત/જાત	કૃષિસલાહ (૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી ભલામણ કરેલ દવા છાંટવી )		
ચોમાસું મગફળી	ફૂલ/સુયા બેસવા/ડોડવા બંધાવા	સફેદ ફૂગ  પાનાં ટપકા/ ચીતરી 	<ul style="list-style-type: none"> <li>મગફળીમાં નિંદામણ કરવું.</li> <li>મગફળીમાં સફેદ ફૂગનો ઉપદ્રવ અટકાવવા ટ્રાયકોડર્મા ફૂગ ૨.૫ કી.ગ્રા./હે. મુજબ ગળતીયા દેશી ખાતર અથવા દિવેલાના ખોળ ૫૦૦ કી.ગ્રા./હે. મિશ્ર કરીને જમીનમાં આપવું.</li> <li>મગફળીમાં પાનનાં ટપકાના રોગનો ઉપદ્રવ નાં થાય તે માટે હેકઝાકોનાઝોલ અથવા ટેબ્યુકોનાઝોલ ૧૬ મિલી દવા ૧ પમ્પમાં નાખીને વરાપે છંટકાવ કરવો.</li> </ul>		
કપાસ	ચાપવા બેસવા, ફૂલ ખીલવા, ઝીન્ડવા બંધાવા	તડતડીયા, સફેદ માખી અને થ્રીપ્સ	<ul style="list-style-type: none"> <li>તડતડીયા, સફેદ માખી અને થ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે ફ્લોનીકામીડ ૫૦ ટકા વે.પા. ૪ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>કપાસમાં ગુલાબી ઇયળના નર ફૂદાને એકત્રીત કરવા માટે હેક્ટરે ૪૦ ની સંખ્યામાં ફેરોમેન ટ્રેપ ગોઠવવાથી ઇયળોનું શરુઆતની અવસ્થાથી જ નિયંત્રણ કરી શકાય. કપાસમાં</li> </ul>		

			<p>ગુલાબી ઈયળથી નુકશાન પામેલ ફૂલ અને ચાપવા તોડીને જમીનમાં દાટી દેવા. વધુ નુકશાન હોય તો પ્રોફેનોફોસ ૫૦% ઇ.સી. ૨૦ મી.લી. અથવા સાયપરમેથ્રીન ૧૦ મિલી બીવેરીયા બાસીઆના ફૂગનો પાઉડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• કપાસમાં પાળા ચડાવવા.</li> <li>• બી.ટી. કપાસમાં યુરીયા અને એમોનિયમ સલ્ફેટ અને મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ દરેક ૩૦ કી.ગ્રા./હે. પુરતી ખાતર તરીકે આપવું.</li> <li>• બી.ટી. કપાસમાં ફૂલ ભમરી, ઝીન્ડવા બનવા અને ઝીન્ડવાના વિકાસની અવસ્થાએ ૨ ટકા પોટેશિયમ નાયટ્રેટના દ્રાવણનો (૧૦ લીટર પાણીમાં ૨૦૦ ગ્રામ) છંટકાવ કરવો.</li> <li>• બી.ટી. કપાસમાં વાવેતર બાદ ૬૦, ૭૫ અને ૯૦ દિવસે ૧ ટકા મલ્ટી માયકોન્યુટ્રીયન્ટના દ્રાવણનો (૧૦ લીટર પાણીમાં ૧૦૦ ગ્રામ) છંટકાવ કરવો.</li> <li>➤ બી.ટી. કપાસમાં ૪.૫ થી ૫ ફૂટની ઊંચાઈએ ઉપરની ટોચ કાપવી, જેથી સારો ફાલ લાગે. તેમજ</li> <li>➤ કપાસના પાકમાં ફૂલ ભમરીખરતી અટકાવવા માં ફૂલ ભમરી ખરતી અટકાવવા અને સારો ફાલ માટે નેથેલીન એસેટિક એસીડનું ૩૦ પીપીએમ દ્રાવણ છાન્ટવુ (પ્લાનોફિક્સ ૭.૫ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છાટવું).</li> </ul>
તલ	ફૂલ/બેઢાં	<p>માથા બાંધનારી ઈયળ અને રાખોડી</p> <p>પાન કથીરી</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• તલમાં પાન વાળનાર ઈયળનો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો કારટેપ હાયડ્રોક્લોરાઈડ ૧૫ ગ્રામ દવા અને હેક્ઝાકોનાઝોલ ૨૦ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> <li>• હુફાળા હવામાનના કારણે તલમાં છુટા છવાયા કુંડાળામાં પાન કથીરનો ઉપદ્રવ જોવા મળેલ હોય તો તેના નિયંત્રણ માટે પ્રોપરગાઈટ દવા ૧૦ મી.લી. ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
બાજરી	દાણા ભરાવા	-	• બાજરીમાં નિદામણ કરવું.
મગ	શીંગ પરીપકવતા	-	• પાકેલી શીંગો સમયસર વીણ લેવી.
અડદ	શીંગ પરીપકવતા	-	• સમયસર કાપણી કરવી.
ચોળી	શીંગ પરીપકવતા	-	• પાકેલી શીંગો સમયસર વીણ લેવી.
તુવેર	વૃદ્ધિ/ઉગાવો	તુવેર માટે બીડીએન-૨, ગુજરાત તુવેર – ૧૦૦, ગુજરાત તુવેર હાઈબ્રીડ-૧,	• વરાપે ઉભા પાકમાં આંતરખેડ અને નિદામણ કરવું.
દિવેલા	ઉગાવો/વિકાસ	લીલી અને ઘોડિયા ઈયળ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• વરાપે ઉભા પાકમાં આંતરખેડ અને નિદામણ કરવું.</li> <li>• દિવેલામાં લીલી અને ઘોડિયા ઈયળના નિયંત્રણ માટે ક્લોરાનટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી (રીનાક્ષીપાયર) દવા ૩ મિલી અથવા ડીડીવીપી ૭૬ ઈસી ૫ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં</li> </ul>

			મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
ડુંગળી ચોમાસું	વૃદ્ધિ	રીંગ વળી જવી અને જાંબલી ઘાબાનો રોગ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ડુંગળીમાં જાંબલી ઘાબા, કોલેટોટ્રાયકમ અને ફ્યુઝેરીયમ ફૂગનો રોગ લાગે નહિ તે માટે પ્રોપીકોનાઝોલ, મેન્કોઝેબ ૪૦ ગ્રામ અને કાર્બેન્ડાઝીમ ૧૫ ગ્રામ ૧ પમ્પમાં વારાફરતી કોઇપણ એક દવા નાખીને ૧૫ દિવસના અંતરે ૩ છંટકાવ કરવા.</li> </ul>
તુરીયા, દૂધી, ગલકા, કારેલા, ગુવાર, કાકડી	ફૂલ/ફળ	શ્રીપ્સ/ સફેદ માખી  કથીરી  તળછારો  ફળ માખી	<ul style="list-style-type: none"> <li>વેલાવાળા શાકભાજીમાં સફેદમાખીના નિયંત્રણ માટે લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીંબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૪ મિલી અથવા એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>જો પાન કથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઇથીઓન ૩૦ મિલી પ્રતિ પંપ છાન્કાવ કરવો.</li> <li>વેલાવાળા શાકભાજીમાં તળછારાના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૪૦ ગ્રામ પ્રતિ પંપમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> <li>જો ફળ માખીનો ઉપદ્રવ જણાય તો ૫૦ ગ્રામ ગોળ અને ૩૦ મી.લી. મેલાથીયોન દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરપે મોટા ફોરાએ છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
ભીંડા	ફૂલ/ફળ	સફેદમાખી,  પાનકથીરી	<ul style="list-style-type: none"> <li>ભીંડામાં સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીંબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૪ મિલી અથવા એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>ભીંડામાં જો પાન કથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઇથીઓન ૩૦ મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.</li> <li>વરસાદ ના હોય તો હળવું પિયત આપવું.</li> <li>ભીંડાની શીંગની વીણી બાદ ૨૦ કી.ગ્રા./હેક્ટર ચુરીયા ખાતર આપવું.</li> </ul>
રીંગણી	ફૂલ/ફળ	સફેદ માખી  ડુંખ અને → ફળ કોરી ખાનાર ઇયળ  પાન કથીરી	<ul style="list-style-type: none"> <li>રીંગણી અને ટામેટીમાં સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીંબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને ડાયફેન્થાયુરોન ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ અથવા ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૫ મિ.લી. દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>ફળ અને ડોકાની ઈયળોનો ઉપદ્રવ હોય તો નુકશાન પામેલ ફળ અને ડોકા તોડીને જમીનમાં દાંટી દેવા અને ક્લોરાનટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી (રીનાક્ષીપાયર) દવા ૩ મિલી અથવા ડીડીવીપી ૭૬ ઈસી ૫ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>રીંગણમાં જો પાનકથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઇથીઓન ૫૦ ટકા ઈસી ૧૫ મિલી અથવા પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઈ.સી. ૧૫ મિલી પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> </ul>

<p><b>મરચી</b></p>	<p>વૃદ્ધિ/ફુલ/ફળ</p>	<p>પાનની શ્રીપ્સ→</p> <p>કુક્ડ-</p> <p>પાનની વાયરસ</p> <p>કથીરી</p>  	<p>➤ મરચીના શરૂઆતના ઝડપી વિકાસ માટે એમોનિયમ સલ્ફેટ અને મયુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર દરેક ૨૫ કી.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટર આપવું અને મિક્સ માયક્રોન્યુટ્રીયન્ટ ૧૦૦ ગ્રામ/પ્રતિ પંપ છાંટવું</p> <p>➤ ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઈ.સી. ૨૦ મી.લી. અથવા એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ અથવા પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મી.લી.અને લીબોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</p> <p>➤ વાયરસના કારણે પીળા થઈ કુક્ડાય ગયેલ છોડ ઉપાડી તેનો જમીનમાં દાટી નાશ કરવો. ત્યાં સફેદ માખીથી ફેલાતો હોવાથી તેના નિયંત્રણ માટે હોસ્ટાથીયોન દવા ૨૦ મી.લી./૧૦ લી. પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</p> <p>➤ જો પાન કથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઇથીઓન ૩૦ મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.</p>
<p><b>લીંબુ</b></p>	<p>ફળનોવિકાસ</p>	<p>સાયલા અને શ્રીપ્સ</p> <p>બદામી ટપકાં</p> <p>પાનકોરીયુ</p>	<p>લીંબુમાં સાયલા અને શ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૫ મીલી અને લીબોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી/૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. વધુ ઉપદ્રવ હોય તો ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૦/૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</p>  <p>બદામી ટપકાના નિયંત્રણ માટે કોપર ઓક્ઝીક્લોરાઈડ ૪૦ ગ્રામ અને ૧.૫ ગ્રામ સ્ટ્રેપ્ટોસાયક્લીનના બે છંટકાવ ૧૫ દિવસના ગળે કરવા.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>પાનકોરીયુના નિયંત્રણ માટે કવીનાલફોસ ૨૦ મી.લી. ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છાંટવી.</li> </ul>

<b>જમરૂખ</b>	ફળનોવિકાસ	<b>ફળમાખી</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>જામફળીમાં ફળમાખી નિયંત્રણ માટે ફેરોમેન ટ્રેપ મુકવા અને મેલાથીઓન ૫૦ ઇસી ૧૦૦ મિલી. + ૧૫૦ ગોળ ૧૦૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી મોટા ફોરાએ સાંજના સમયે છાંટવી.</li> </ul>
પશુ/ મરઘા 	<p>પ્રજીવથી થતા રોગોની ચકાસણી કરાવવી અને કરમિયાની દવા આપવી.. ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટ્રાઝ ૨ મિ.લિ. એક લિટર પાણીમાં નાખીને છાંટવી. વિટામીન એ તથા ડી પુરકો આપવા. વરસાદના સમયે પશુઓને સુરક્ષિત જગ્યાએ રાખવા. ચોમાસા દરમિયાન જાનવરોને રહેઠાણની જગ્યાની વ્યવસ્થિત સફાઈ તેમજ માખીઓના ઉપદ્રવથી બચવા ફિનાઈલ છાંટવું. દુધાળા પ્રાણીઓને નિયમિત ૧ કિલ્લો ફીડ + ૫૦ ગ્રામ ખનીજ તત્વોનું મિશ્રણ પ્રતિ ૨ લીટર દુધની ઊપજના પ્રમાણમાં આપવું. તેમજ લીલું ઘાસ + સૂકું ઘાસ + ખનીજ તત્વો ખોરાકમાં આપવા. ખુલ્લામાં રાખેલ ઘાસસારો વરસાદથી બગડે નહિ તે માટે જરૂરી પગલા ભરવા.</p>		
<b>નોંધ</b>	<p><b>નીચેની એપ ડાઉનલોડ કરો</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>મૌસમ એપ</b> જીલ્લા પ્રમાણે હવામાન આગાહી અને ચેતવણી માટે.</li> <li><b>મેઘદ્રૂત એપ</b> હવામાન આધારિત કૃષિસલાહ બુલેટીન માટે.</li> <li><b>દામીની એપ</b> વરસાદી વીજળીની ચેતવણી માટે.</li> </ul>		

જા.નં.જુફ્યુ/સૂ.ખે./એગ્રોમેટ/બુલેટીન/ / ૨૦૨૧,  
તરઘડિયા(રાજકોટ), તારીખ:૩૧/૦૮/૨૦૨૧.

તંત્રીશ્રી/ડાયરેક્ટરશ્રી,  
રાજકોટ,


ઉપરોક્ત માહિતી આપના દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં ,રેડીયોમાં ગામના ચોરાના કાર્યક્રમમાં તથા ટીવીના ગ્રામ્ય કાર્યક્રમમાં વિનામૂલ્યે પ્રસિધ્ધ કરાવવા નમ્ર વિનતી છે. સહકારની અપેક્ષા સહ આભાર.

ટેક્નીકલ ઓફિસર  
સુકીખેતી સંશોધન કેન્દ્ર  
જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી  
તરઘડીયા



NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 34  
(20.08.2021 to 26.08.2021) over Agricultural region

Gujarat



Agricultural vigour is moderate over isolated places of the state.



**Gramin Krushi Mausam Seva**  
**Main Dry Farming Research Station**  
**Junagadh Agricultural University**  
**AMFU-Targhadia (Rajkot) - 360 023**  
**Cell :94269 38235**



**Agromet Advisory Service bulletin No. 45 for North Saurashtradistricts(Gujarat)**

**(Issued jointly by AMFU-DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) & India Meteorological Department)**

**(Period 04 to 08-September- 2021)**

**Significant past weather for the preceding week of Rajkot**

Rainfall (mm)	101.6
Maximum temperature (°C)	28.9-34.7
Minimum temperature (°C)	22.5-24.0
Relative Humidity (%) I	87-98
Relative Humidity (%) II	61-92
Wind speed (Kmph)	3.0-6.4

**Weather forecast until 08-30 hrs. of 08/09/2021**

**(1) RAJKOT DISTRICT:**

	04/09/2021	05/09/2021	06/09/2021	07/09/2021	08/09/2021
Rainfall (mm)	30	9	1	0	23
Max.Temp.(°C)	31	31	31	32	32
Min.Temp.(°C)	25	25	26	26	27
RH-I (%)	88	87	85	85	86
RH-II (%)	64	62	58	58	56
Wind Speed (kmph)	18	21	19	16	13
Wind Direction(deg.)	248	248	248	248	252
Total CC (octa)	5	6	5	7	8

- **Rainfall:** Warm, humid and generally cloudy to cloudy weather and light to moderate rainfall on 04, 05, 06 and 08 –September forecasted.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 31-32°C and 25-27°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 85-88 % & 56-64,

respectively.

- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be W and 13-21 km/h, respectively.

## (2) MORBI DISTRICT:

	04/09/2021	05/09/2021	06/09/2021	07/09/2021	08/09/2021
Rainfall (mm)	26	2	0	0	13
Max.Temp.(°C)	31	31	31	32	32
Min.Temp.(°C)	25	25	26	26	27
RH-I (%)	85	82	80	78	80
RH-II (%)	55	59	51	51	50
Wind Speed (kmph)	21	25	23	19	14
Wind Direction(deg.)	249	248	248	248	257
Total CC (octa)	6	5	5	7	8

- **Rainfall:** Warm, humid and generally cloudy to cloudy weather and light to moderate rainfall on 04, 05 and 08-september forecasted.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 31-32°C and 25-27°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 78-85 % & 50-59, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be W and 14-25 km/h, respectively.

## (3) DEVBHUMI DWARKA DISTRICT:

	04/09/2021	05/09/2021	06/09/2021	07/09/2021	08/09/2021
Rainfall (mm)	19	2	1	1	1
Max.Temp.(°C)	27	27	27	27	28
Min.Temp.(°C)	24	24	24	25	25
RH-I (%)	86	86	83	82	81
RH-II (%)	65	73	65	63	65
Wind Speed (kmph)	25	24	22	19	13
Wind Direction(deg.)	270	249	248	248	249
Total CC (octa)	6	6	4	6	7

- **Rainfall:** Warm, humid and Partly cloudy to generally cloudy weather and light to moderate rainfall forecasted for next five days.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 27-28°C and 24-25°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 81-86 % & 63-73, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be W and 13-25 km/h, respectively.

#### (4) SURENDRANAGAR DISTRICT:

	04/09/2021	05/09/2021	06/09/2021	07/09/2021	08/09/2021
Rainfall (mm)	30	11	0	0	31
Max.Temp.(°C)	31	31	31	32	32
Min.Temp.(°C)	25	25	26	26	27
RH-I (%)	85	83	80	78	84
RH-II (%)	60	58	52	52	54
Wind Speed (kmph)	18	21	20	17	12
Wind Direction(deg.)	248	248	248	248	248
Total CC (octa)	5	5	6	8	8

- **Rainfall:** Warm, humid and generally cloudy to cloudy weather and Moderate rainfall on 04, 05 and 08-September forecasted.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 31-32°C and 25-27°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 78-85 % & 52-60, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be W and 12-21 km/h, respectively.

#### (5) AMRELI DISTRICT:

	04/09/2021	05/09/2021	06/09/2021	07/09/2021	08/09/2021
Rainfall (mm)	26	19	3	1	11
Max.Temp.(°C)	30	30	30	30	29
Min.Temp.(°C)	25	25	25	26	26
RH-I (%)	92	90	88	87	89
RH-II (%)	70	63	61	62	62
Wind Speed (kmph)	17	18	16	14	12
Wind Direction(deg.)	248	249	248	249	257
Total CC (octa)	4	5	5	7	8

- **Rainfall:** Warm, humid and Partly cloudy to generally cloudy weather and light to moderate rainfall forecasted for next five days.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 29-30°C and 25-26°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 87-92 % & 61-70, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be W and 12-18 km/h, respectively.

## (6) JAMNAGAR DISTRICT:

	04/09/2021	05/09/2021	06/09/2021	07/09/2021	08/09/2021
Rainfall (mm)	29	9	1	0	3
Max.Temp.(°C)	28	28	28	28	29
Min.Temp.(°C)	23	23	23	24	24
RH-I (%)	86	86	84	83	81
RH-II (%)	64	69	63	61	59
Wind Speed (kmph)	23	24	21	18	14
Wind Direction(deg.)	257	248	248	248	249
Total CC (octa)	6	5	5	7	8

- **Rainfall:** Warm, humid and generally cloudy to cloudy weather and light to moderate rainfall on 04, 05, 06 and 08-September forecasted.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 28-29°C and 23-24°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 81-86 % & 59-69, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be W and 14-24 km/h, respectively.


## Agro meteorological Advisories:

<b>General Advice</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Keeping in view of threat of COVID-19 spread farmers are advised to follow the government guidelines, personal hygiene, use mask, ensure hand washing with soap at reasonable interval, social distancing of 6 feet during harvesting and other agricultural operation in all crops.</b></li><li>• <b>Weather outlook for subsequent week: As per extended range forecast, humid and generally cloudy to cloudy weather and light to Moderate rainfall likely to observe during 08 to 13-September 2021.</b></li><li>• <b>To protect crop against sucking pests like jassid, thrips and aphid spray imidachlopride 17.8 SL 5 ml/10 litre water.</b></li><li>• <b>Apply supplementary dose of nitrogenous fertilizers to kharif crops as per recommendation.</b></li><li>• <b>Under complete failure of timely sown crops due to prolong dry spell and then if sufficient rainfall during this spell, carry out sowing of Ajwain (Guj.-Ajama-1 &amp; 2), Sesame (Guj. Sesame-3 &amp; 4, Purva-1), castor (GCH-4,7), Sorghum fodder ( Gundhari, GFS-3, GAFS-11,CSV-21F, S-1049), Pigeon pea (BDN-2,Vaishali,GJP-1), chick pea (for green pod).</b></li></ul>
-----------------------	---







- **Sms : Farmers are advised to apply Urea, ammonium sulphate and murate of potash fertilizers each @ 30 kg/ha in cotton.**

Crops	Stage	Insect/Pest/ Variety	Advisory
<i>Kharij</i> groundnut	Pod formation/dev elopment	Stem rot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Carry out weeding</b></li> <li>• <b>Apply 2.5 kg/ha Trichoderma fungus with well decopost FYM OR castor cake @ 500 kg/ha as preventive measures against Sclerotium rolfstii stem rot.</b></li> <li>• <b>Spray Tebuconazole 10 ml/10 lit of to prevent leaf spot infestation in groundnut.</b></li> </ul>
<b>Cotton</b>	Squaring /flowering	Thrips, white fly & Jassids	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Under present weather condition, infestation of Jassids, whitefly and thrips observe in cotton, for control the pest spray Flonicamid 50 % WG % 4gm/ 10 lit of water.</b></li> <li>• <b>Farmers are advised to apply Urea, ammonium sulphate and murate of potash fertilizers each @ 30 kg/ha in cotton.</b></li> <li>• <b>For the monitoring of pink bollworm infestation in cotton crop farmers are advised to put pheromone traps 6-8/ha.If infestation found,pick and burry the infested flowers/bolls in soil for control of pink bollworm infestation in cotton. Also make spray of profenofos 50 EC 20 ml in 10 liters of water.</b></li> <li>• <b>Farmers are advised to spray 3 % KNO3 solution in at flowering, boll initiation and 50% boll formation to Bt. Cotton crop under irrigated condition.</b></li> <li>• <b>Foliar spraying of multi-micronutrient formulation Grade IV (Fe-Mn-Zn-CuB, 4.0-1.0-6.0-0.5-0.5 %) @ 1% at 60, 75 and 90 DAS in Bt. cotton crop is advised under irrigated condition.</b></li> <li>• <b>Detopping of cotton should be done in crop having</b></li> </ul>

			<p>4.5-5 feet height.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Under present weather, farmers are advised to spray 30 ppm Naphthalene Acetic Acid solution (planofix 7.5 ml/10 liter of water).</b></li> <li>• <b>Carry out interculturing &amp; weeding to remove weed and conserve soil moisture.</b></li> <li>• <b>Do earthing up in timely sown cotton crop.</b></li> </ul>
<b>Sesame</b>	Capsule formation/development	<p>Leaf webber.</p> <p>Phytophthora blight and leaf spot diseases</p> <p>Mite</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>If infestation of leaf Webber above ETL, spray Cartep Hydrochloride 15 gram in 10 litres of water OR Neem Seed Kernel Extract (NSKE) 3% (300g /10 l water).</b></li> <li>• <b>Keeping in view of constant wet period to prevent infestation of fungal disease(Phytophthora blight, powdery mildew and leaf spot) in sesame make spray of Ridomil fungicide 15 gm in 10 litre of water.</b></li> <li>• <b>Due to warm weather sporadic patches of mite infestation observe in sesame crop, to prevent further infestation and to control present one carry out spraying of propargite 57 % EC 10 ml in 10 litre of water under clear sky.</b></li> </ul>
<b>Pearl millet</b>	Grain filling	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Carry out weeding as per need.</b></li> </ul>
<b>Green gram</b>	Pod maturity	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pick mature pods in time.</b></li> </ul>
<b>Black gram</b>	Pod maturity	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Harvest the crop at maturity.</b></li> </ul>
<b>Cow pea</b>	Pod maturity	Yellow mosaic viral disease	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mature pods should pick in time.</b></li> </ul>
<b>Pigeon pea</b>	Growing	BDN-2, GT-100, GJP-1, Vaishali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Carry out inter culturing and weeding.</b></li> </ul>
<b>Castor</b>	Germination/growing	Heliothis and semilooper	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>To control Heliothis &amp; semilooper in castor spray chlorantraniliprole 18.5 % SC 3.0 ml or /10 litre of water is advised.</b></li> </ul>
<b>Onion Kharif</b>	Sowing/Growing	Purple blotch blight & Ring diseases	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>To prevent purple blotch blight, colletotrichum and fuserium fungus disease infestation in onion make 3 alternate spray of Propiconazole 15 ml, Mencozeb 25 gm and Carbendazim 10 gm in 10 litre of water at 15 days interval.</b></li> <li>• <b>To control weed spray oxyflourfen 10 ml/10 litre of water.</b></li> </ul>

<b>Ridge gourd, Bottle gourd, Sponge guard, Bittergourd, Cluster bean, Water melon</b>	Flowering & fruiting	White flies/  Mites  Fruit fly  Downy mildew	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In all vegetable crops, whitefly infestation observed above ETL, for control of whitefly, spray 500 ml of 5 % neem seed extract or 50 ml neem oil or acetamiprid 20 % SP@ 5.0 g or imidacloprid 17.8 SL 3 ml/10 litre of water.</b></li> <li>• <b>If population of mite is observed, then to control it, do spraying of Ethion 50 EC 15 ml in 10 litre of water.</b></li> <li>• <b>For the control of fruit fly make spray solution of 50 gm jaggery and 30 ml Malathion in 10 litre of water with large droplets.</b></li> <li>• <b>For the control of downy mildew, spray Mancozeb 75 WP 35 g mix in 10 litre of water.</b></li> </ul>
<b>Ladyfinger</b>	Flowering/fruiting	Mites  White flies/Jassids	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Constant monitoring of lady finger crop against attack of mite is advised. If population is found more, then spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre of water is advised.</b></li> <li>• <b>For control of whitefly &amp; jassids in Okra, spray 500 ml of 5 % neem seed extract or 50 ml neem oil or acephate 75 % SP@ 15 gm or imidacloprid 17.8 SL 3 ml/10 litre of water.</b></li> <li>• <b>After harvesting of mature okra, urea should be applied @ 15-20 kg/ha.</b></li> </ul>
<b>Brinjal</b>	Flowering/fruiting	<b>Sucking pest</b> →  Shoot & Fruit borer  Mites	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>For minimize population of whitefly, spray 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml or Difenthiuron 50 WP @ 16 gm / 10 lit of water.</b></li> <li>• <b>In brinjal and tomato crops, monitoring of borers by using pheromone traps 4-6 per acre is advised. For control of shoot and fruit borer in brinjal and tomato crops, infested fruits and shoots should be collected and buried into the soil. If insect population is above ETL then spraying of chlorantraniliprole 18.5 % SC 3.0 ml or DDVP 7 ml/10 litre of water is advised.</b></li> <li>• <b>If infestation of mite is observed in brinjal, then spraying of Ethion 50 EC 15 ml or Propargite 57 % EC @ 10 ml/ 10 litre of water.</b></li> </ul>
<b>Chili</b>	Flowering & fruiting		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Under present weather condition in transplanted hybrid chili to push up growth make application of ammonium sulphate and murate of potash fertilizers each @ 25 kg/ha</b></li> </ul>




		<p><b>Thrips</b> →</p>  <p>Leaf curling Virus →</p>  <p>Mites</p>	<p><b>and make spraying of mix micronutrients 100 gm/10 lit. of water.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>For the control of thrips in chili make spray of profenofos 20 ml with 500 ml of 5 % neem seed extract or neem seed oil 50 ml in 10 litres of water. In case of heavy attack, spray of spinosad or spinetoram 3 ml per 10 liter of water.</b></li> <li>• <b>Under present weather conditions, rouging of viral infested plants should be done in chili. Infected plants should be uprooted and buried in the soil. After rouging, spraying of Imidacloprid @ 5 ml per 10litre of water is advised for control the vector, when sky remains clear.</b></li> <li>• <b>Constant monitoring of the chilli crop against attack of mites is advised If population is found more, then spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre of water.</b></li> </ul>
<b>Lemon</b>	Fruit development	<p><b>Psylla and thrips</b></p>  <p><b>Citrus canker</b></p> <p><b>Leaf minor</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>To prevent damage of psylla &amp; thrips spray imidacloprid 30.5 % 5 ml / 10 lit of water ml/10 lit of water.</b></li> <li>• <b>Spray copper oxychloride 40 gm or streptocyclin 1.5 gm in 10 litre of water</b></li> <li>• <b>Spray Quinalphos 20 ml in 10 litres of water for control of leaf minor.</b></li> </ul>
<b>Guava</b>	Fruit development	Fruit fly	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>For the control of fruit fly in Guava put 5-6 Pheroman trap/ha and spray Malathion 50 % EC 100 ml + 150 gm jaggery solution in 100 litre water during evening hours with large spray droplets.</b></li> </ul>
<p><b>Livestock &amp; poultry</b></p> 	<p>Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the control of tick. Deworming, Protozoan disease evaluation and its treatments should be done. Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. For milch animals, regularly follow schedule of 1 kg feed + 50 g mineral mixture per 2 liters of milk yield. Feed animals with a mixture of green grass + hay + minerals + dry feed. Ensure regarding vaccination of animals for different diseases in rainy season. Spray phenyl in the animal shed to avoid fly's and mosquitoes. Keep fodder in safe place to avoid spoilage due to rainfall.</p>		

<b>Note</b>	<p><b>Kindly download</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MAUSAM App</b> for location specific forecast &amp; warning.</li> <li>• <b>MEGHDOOT App</b> for Agromet advisory.</li> <li>• <b>DAMINI App</b> for lightning warning.</li> </ul>
-------------	--

**Technical Officer, GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia.**

**NOAA/VIIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 34  
(20.08.2021 to 26.08.2021) over Agricultural region**



Agricultural vigour is moderate over isolated places of the state.